

NOTITIE 43Witkoppige Staartmees

Op 22 april 1972 waren de heer S.H.Poelstra en ik bezig met de inventarisatie van de ons als werkgebied toegewezen Blaricummerheide. Toen wij om ca 8.30 uur de bosjes langs het pad, dat de zuidelijke afscheiding van dit heidegebied vormt, aan een nauwkeurige inspectie onderwierpen, hoorden wij het geluid van Staartmezen. Onmiddellijk richtten wij de kijkers op de jonge berken, waarop zij aan het focrageren waren.

"Moet je zien, dat is een witkop" riep ik uit. "Welnee, hoe komt u er bij? Het is een heel gewoon getekende Staartmees" was de reactie. Het bleek dat we ieder naar een ander exemplaar aan het kijken waren. We hebben toen van waarnemingsobject geruild en konden beiden vaststellen, dat zich hier een normaal getekende Staartmees in gezelschap van een witkop ophield.

Wij vonden het interessant genoeg om deze melding, nadat de heer Jonkers juist in de Korhaan van april 1972, blz. 21, een analoge waarneming op de Veluwe had gepubliceerd, even vast te leggen.

J.Klein

We moeten oppassen, dat we niet elke Staartmees met een witte kop gaan zien als een noordelijke vorm (*Aegithalos caudatus caudatus*). De Nederlandse Staartmezen behoren tot de ondersoort *Aegithalos caudatus europaeus*. Bij deze ondersoort komen veel variaties in koptekening voor. Witkoppige Staartmezen kunnen ook van deze ondersoort zijn. Bij de noordelijke vorm zijn de kop, de hals en de onderdelen zuiver wit. Bij onze Staartmezen zijn de onderdelen witachtig rose. Ik wijs u nogmaals op de notitie (37) van Prof.Dr.K.H.Voous in de Korhaan van februari 1972.

Red.