

WAARNEMINGEN VAN REGELMATIG AANWEZIGE VOGELS.

1. Fuut: steeds aanwezig; aantal neemt sterk af van een paar honderd in januari tot enkele exemplaren in april; (op 3-4-1971: 500 ex.);
2. Aalscholver: vanaf begin maart aanwezig; variërend van enkele tot 60 ex.,
3. Blauwe Reiger: bijna altijd aanwezig, echter geringe aantallen,
4. Wilde Eend: ontbreekt nooit; vele honderden in januari/februari, enige tientallen in maart/april,
5. Slobeend: aanwezig vanaf eind februari in geringe aantallen (meestal minder dan 10),
6. Kuifeend: bijna altijd aanwezig, echter bij lange na niet de aantallen die we gewend waren (en zijn van andere trajecten); maxima: 26-2: 685 ex.; 14-3-1971: 4300 ex. 28-2-1970: 50.000 ex.,
7. Tafeleend: teleurstellend weinig aanwezig; 8 maal waargenomen; maximaal 68 ex. op 26-2; op 7-2-1971: 1025 ex. en op 28-2-1970: 28.500 ex.,
8. Brilduiker: 6 keer waargenomen; zeer geringe aantallen; op 21-2-1971: 5500 ex.,
9. Grote Zaagbek: meestal aanwezig tot april; variërend in aantal van enkele tientallen tot 214 ex. op 8-1,
10. Nonnetje: regelmatig aanwezig tot half maart; 29-1: 472 ex.; aanzienlijk meer dan in 1971 (toen ontbraken de Nonnetjes in januari als gevolg van ijs en harde wind en waren ook later weinig talrijk; echter op 7-2-1971: 730 ex.),
11. Bergeend: in maart en april (evenals in 1971) in kleine aantallen aanwezig,
12. Br. Kiekendief: 4 waarnemingen in april tot 4 ex. (in 1971 3 keer 1 ex. in april),
13. Bl. Kiekendief: regelmatig aanwezig, evenals in 1971 (maximaal 5 ex.),
14. Torenvalk: evenals in 1971 altijd aanwezig; maximaal 7 ex. op 19-3 (in 1971: 14 ex. op 11-4),
15. Fazant: altijd aanwezig; maximaal 80 ex. op 19-3 (in 1971: 220 ex. op 2-1),
16. Waterhoen: slechts 6 waarnemingen van 1 of 2 ex. (in 1971 ook weinig; echter 14 ex. op 11-4),
17. Meerkoet: altijd aanwezig; maximaal 1400 ex. op 5-2 (in 1971 2100 ex. op 7-2; 2100 ex. op 27-2 en 6000 ex. op 7-3),
18. Scholekster: regelmatig aanwezig (maximaal 25 ex. op 19-3),
19. Kievit: regelmatig aanwezig (maximaal 50 ex. op 19-3),
20. Grutto: eerste waarneming: 10 ex. op 19-3; daarna regelmatig (1ste waarneming in 1971: 1 ex. op 13-2; vanaf 27-3 regelmatig),
21. Tureluur: vanaf 1-4 enkele ex. (in 1971 1ste waarneming: 2 ex. op 14-3),
22. Kemphaan: eerste waarneming: 6 ex. op 21-4 (in 1971 vanaf 14-3 19 ex.),
23. Kluut: vanaf 1-4 aanwezig; maximaal 18 ex. op 29-4 (in 1971 vanaf 27-3, maximaal 39 ex. op 17-4),
24. Gr. Mantelmeeuw: vrijwel steeds aanwezig; maximaal 26 ex. op 1-4,
25. Zilvermeeuw: vrijwel steeds aanwezig; maximaal 27 ex. op 4-3,
26. Stormmeeuw: regelmatig aanwezig; maximaal 47 ex. op 8-1,
27. Kokmeeuw: altijd aanwezig; maximaal 400 ex. op 29-1 (talrijker dan in 1971),
28. Visdiefje: vanaf 21-4 2 keer 2 ex.,

29. Veldleeuwerik: 5 waarnemingen (35 ex. op 23-1),
30. Graspieper: 5 waarnemingen, } (Op 13-1 is de heer J. Bos met een
31. Oeverpieper: 1 waarneming, } "Weasel"-rupsvoertuigje langs een
slijkpad de polder in geweest en nam
in groepjes in totaal ca. 75 Oever-
piepers en ca. 20 Graspiepers waar.)
32. Witte Kwikst.: 6 ex. op 19-3; daarna 4 keer 1 ex.,
33. Merel: vrij regelmatig in de Wilgen langs de dijk (14 ex. op
19-3),
34. Snor: 1 ex. op 21-4 (in 1971 vanaf 17-4 (3 ex.) aanwezig),
35. Koolmees: vrij regelmatig in de Wilgen langs de dijk (op 18-2:
25 ex.),
36. Pimpelmees: idem (20 ex. op 26-2),
37. Baardmees: 4 waarnemingen; gering aantal (in 1971 2 waarnemingen),
38. Rietgors: 2 ex. op 18-2; daarna vanaf 19-3 (12 ex.) steeds aan-
wezig,
39. Spreeuw: altijd aanwezig, echter steeds geringe aantallen (met
uitzondering van 1-4: 1000 ex.),
40. Zwarte Kraai: regelmatig aanwezig tot kleine aantallen,
41. Bonte Kraai: altijd aanwezig tot 19-3 (in 1971 tot 17-4); variërend
van enkele tot maximaal 34 (1971: max. 59).