

reactie op waarnemingen

Twee waarnemingen van in ons land zelden voorkomende vogels, vermeld in de laatste Korhaan (7de jaargang, nr.1), geven mij aanleiding te reageren. De eerste is die van de Slangenarend (*Circus gallicus*). Voor de volledigheid zet ik de gegevens van de waarnemers en de literatuurgegevens tegenover elkaar, zodat het dan eenvoudiger is punten van overeenkomst te ontdekken.

gegevens van de waarnemers:

Veel groter dan Buizerd of Kieken-dief, min of meer grootte van de Grote Mantelmeeuw (=+ 73 cm, D.M.J.)
Vleugel van Gr.Mantelmeeuw is ongerekend ca. 120 cm.

Vleugels lang, stijf, smal, vrijpuntig, 6 grote slagpennen.

Onderzijde nagenoeg wit, bruine borstrand, donkere eindband op de staart, toppen van de grote slagpennen en ondervleugeldeken zwart. Twee polsvegen i.p.v. polsvlekken. Poten geel, tegen het lichaam aan.

Snavel: grijs

Staart: smal en lang, met donkere eindband.

Kop niet erg lang, zoals bij Wespendief of Visarend; met donkere tekening, ongeveer als Boom- of Slechtvalk

De twee waarnemingen, waarop gedoeld werd, waren die van half november '07 in Oldenbroek en één uit de winter 1962/63 bij de Lauwerzee. Met alle respect voor de nauwkeurige beschrijving door de waarnemers, lijkt het mij twijfelachtig hier met een Slangenarend te doen te hebben gehad. Het grootste deel van de gegevens wijst in de richting van een Ruigpootbuizerd; het verschil tussen 't vleugelbereik van de Slangenarend (155-160 cm) en van de Ruigpootbuizerd (130-152 cm) blijft natuurlijk discutabel. De laatste ligt echter het dichtst bij de Grote Mantelmeeuw.

Het geval van de Witstuitbarnsijs ligt nog moeilijker. Qua grootte zit er bijna geen verschil tussen de Barnsijs en de eerstgenoemde. Gezien de vele
(vervolg op de volgende pagina, onderaan)

Slangenarend:

Grootte van 66-69 cm. Vleugelwijdte 155-160 cm.

Vrij brede vleugels.

Ondervleugels en onderdelen bijna effen wit, behalve donkere keel en bovenborst. Vleugelpunten zwart.

Donkere lijntekening op ondervleugels valt van dichtbij op.

Poten grauwwit, bruinwit of blauwachtig, soms met roze gloed.

Snavel: donkergrijs tot zwartachtig loodgrijs.

Staart vrij lang; heeft 3-4 onduidelijke dwarsbanden.

Kop uitzonderlijk groot, rond en uilachtig. Oogstreek donker, voorhoofd witachtig.

vervölg van pagina 32.

variatices die mogelijk zijn bij de subspecies van de Barmsijs en die determinatie in het veld en zelfs bij ringonderzoek bijzonder bemoeilijken, zou ik willen aanbevelen deze waarneming te herzien en er Barmsijs van te maken. De summiere gegevens waarbij alleen sprake is van een lichte ongevlekte stuit steunen mij hierin,

D.A. Jonkers.