

INVENTARISATIE BROEDVOGELS VAN "DE LIMITEN" 1974

Terrein: a. beukenbos zonder andere bomen, zonder onderbegroeiing: 5 ha.
b. grove dennen, erg open door stormschade, veel woekering van Prunus en Sorbus: 5 ha.
c. verder een oprijlaan met veel Eiken, Beuken en Grove dennen, een paar weilanden, een heel klein boomgaardje en een paar rijen Eiken met veel natuurlijke holtes. Ook een flinke (meer dan 100 m.) Meidoornhaag. Het terrein is absoluut niet toegankelijk.

Ligging: Tussen Naarden en Huizen en ten zuiden van Oud-Naarden. Onsloten door heidevelden (o.a. Limitische heide), bossen (o.a. Flevo-oord van Unilever) en weilanden. Ideaal voor roofvogels en uilen!

Kanttekeningen: In 1973 was de inventarisatie, door mijn onervarenheid, niet erg nauwkeurig. Minimale aantallen broedgevallen werden genoteerd. Ook werden enkele gegevens verzameld van vóór 1973.

De Bergeend komt in het voorjaar en begin zomer op de weilanden voor, soms met over de twintig paren tegelijk! Door verstoring, vooral van de kant van honden, komen er jaarlijks hooguit twee paar tot broeden. De honden graven ze uit, verstoren ze en jagen ze zelfs de bomen in.

Een wijfje in grote legnood deponeerde in 1973 zelfs een ei hoog boven de grond in een Torenvalkkast!

De Holenduiven hebben in 1974 geen jongen groot kunnen brengen, hoogstwaarschijnlijk doordat de Bosuil de kasten, waarin de wijfjes zich bevonden, kraakte en de wijfjes domweg als prooi meenam. In twee kasten lagen de eieren (in beide gevallen 2) half onder de vulling en van elkaar (maar heel) onder een dek van kleinere en grotere Holenduifveertjes.

Zoogdierenwerk lijkt mij dit niet; alleen een Eekhoorn zou de dader kunnen zijn, maar aangezien de eieren ongenoeid waren gelaten.....

De veren waren niet afgebeten, maar uitgetrokken of uitgevallen. Aan een enkele kleefde wat geronnen bloed. Tegen deze vorm van kraken is niets te doen en ik vrees het ergste voor volgend jaar.

Door ophangen van nestkasten, kunstnesten (grootte: 50-100 cm) en plankjes, werd gepoogd de dichtheid van enkele minder algemene soorten wat te verhogen. De resultaten (vanaf 1973 werden ze opgehangen) waren goed.