

EEN WITWANGSTERN OP HET LAARDER WASMEER

Zaterdagmiddag 17 mei 1975 kwam Eduard Osieck mij waarschuwen: Hij had een Witwangstern (Chlidonias Hybrida) ontdekt op het Laarder wasmeer! Direkt ben ik met hem meegegaan, teneinde de stern ook te zien. Daar aangekomen zagen we aanvankelijk slechts een 30-tal Zwarte sterntjes, die behendig aan het fourageren waren. Plotseling ontdekten we de Witwangstern. De vogel zat in de top van een Lisdodde te rusten. Het gelukte ons de Witwang tot op een afstand van ca. 25 meter te naderen. Hij zat nog steeds op de Lisdodde en we konden de vogel zo duidelijk zien. Na korte tijd ging de Witwangstern weer fourageren tussen de Zwarte sterns. Hierbij was zijn manier van vliegen anders dan die der laatstgenoemde.

Beschrijving:

Groter en forser dan Zwarte stern, echter lichtere (licht grijze) bovenvleugel, rug, nek en bovenstaart; bredere en ook minder puntige vleugels; kapkop zwart als van Vissdief, maar witte wangen kontrasterend door grijze kin en borst, geleidelijk overgaand in zwartgrijze buik; rode snavel en poten, die langer leken dan bij andere sterns; licht gevorkte staart bij "staart spreiden"; korte staart als van Zwarte stern; iets dikkere snavel; krachtige vlucht, rechtlijniger dan Zwarte stern, "zwaardere" vleugelslag; éénmaal horen roepen: rauw en schor (beschrijving E.R. Osieck).

's Avonds ben ik nog eens naar het Wasmeer gegaan. Slechts éénmaal kon ik de Witwangstern in de kijker krijgen. Vermoedelijk is hij diezelfde avond, gelijk met de Zwarte sterns, weggetrokken. De volgende dagen was de vogel tenminste niet meer te zien. Echter, op vrijdagavond 23 mei werd deze stern nog door R. van Poelgeest waargenomen. Hij konstateerde eveneens, dat om ca. 20.00 uur de Witwangstern gelijk met het zestal aanwezige Zwarte sterns wegvloog.

Opvallend was, dat het aantal Zwarte sterns in de week na de 17e mei aanmerkelijk gedaald was tot maximaal 4 exemplaren. Op 23 mei weer 6 exemplaren en 24 mei 14 exemplaren. Mogelijk hield de Witwangstern zich steeds bij een bepaald groepje Zwarte sterns op.

In Nederland wordt de Witwangstern, behoudens een paar broedgevalen, als onregelmatige gast aangemerkt. Tot nog toe werden ca. 40 waarnemingen bekend.

Voor wat het Laarder wasmeer betreft is dat de tweede bekende waarneming. In de zomer van 1940 werd er 1 exemplaar waargenomen door o.a. Binsbergen en Morra (archief J. Harder).

J. Harder