

WITKOPPIGE STAARTMEZEN (Aegithalos caudatus europaeus) IN HET GOOI

Van de heer B.J. van Ingen uit Naarden vernam ik dat hij tijdens ringwerkzaamheden in de Ankeveense Polder op 12 oktober 1975 twee Staartmezen had gevangen, die een afwijkende koptekening vertoonden.

Toen ik enige tijd later de dia's van deze vogeltjes zag (helaas iets overbelicht, waardoor o.a. het contrast van de rugtekening niet duidelijk meer is waar te nemen) was deze afwijking hierop goed te zien.

Eén der vogels had een geheel witte kop, terwijl de ander nog een hele vage wenkbrauwstreep bezat. Het lijkt mij dan ook niet aannemelijk dat wij hier te maken hebben gehad met de noordelijke "witkop" (A. caudatus caudatus), maar dat het een witkoppige "streepkop" Staartmees is geweest. Te meer daar deze twee vogels deel uitmaakten van een groepje gewone streepkoppige Staartmezen.

Vocus (1968) schat het aantal witkopjes onder de Nederlandse broedvogels op minder dan 10 %, hetgeen hij baseert op tellingen van Staartmezen in de Nederlandse wetenschappelijke vogelcollecties.

Mijns inziens is deze 10 % een te hoge schatting, daar men namelijk eerder geneigd zal zijn een witkop(pige) Staartmees op te sturen dan een "gewone" streepkoppige Staartmees. Ook eigen veldwaarnemingen en ringvangsten van mij bekende ringers maken de schatting van 10 % voor-als-nog niet aannemelijk.

R.G. Moolenbeek

Literatuur:

- Jonkers, D.A. (1972) : Nog eens een waarneming van een witkoppige Staartmees, de Korhaan, jrg. 6(4) pag. 21.
Klein, J. (1972) : Witkoppige Staartmees, de Korhaan, jrg. 6(5)p. 11.
Rynja, F. (1972) : Staartmezen, de Korhaan, jrg. 6(1) pag. 23-24.
Vocus, K.H. (1968) : Over de herkomst van Witkoppige Staartmezen in Nederland, Vanellus, 21ste jaargang, pag. 91-94.
Vocus, K.H. (1972) : Over Witkopstaartmezen in Nederland, de Korhaan, jaargang 6(2) pag. 10.
-