

RESULTATEN VAN DE ROOFVOGELTELLING 1976

.....

Inleiding

Voor de vijfde keer werd de jaarlijkse wintertelling van roofvogels gehouden. Dit jaar was dat op het weekeinde 14-15 februari.

De polders Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland en de polders aan de randmeren tussen Muiden en Kampen boven de rijkswegen Muiden-Hoevelaken en Hoevelaken-Ysselbrug werden geteld.

Telgebieden

De in 1975 niet onderzochte telgebieden Muiden-Naarden en Kampen-Elburg waren nu wel opgenomen. Verslagen over de tellingen 1971-1975 verschenen in de Korhaan 1972 (6);3, 1973 (7);3, 1974 (8);3 en 1975 (9);5.

Weersomstandigheden

Op 14 februari waaide er een matige tot krachtige noord-oostenwind, de hemel was over het algemeen zwaar bewolkt en de temperatuur kwam niet boven de 2°C. De volgende dag was de wind matig en naar noord gedraaid. De bewolking was nog steeds zwaar, af en toe was het zelfs zonnig.

Ondanks de zon bleef de temperatuur rond de 0°C. schommelen. Het zicht op de beide teldagen was goed.

Methode

Aan de methode als beschreven in de Korhaan 1975 (9);5 werd niets veranderd. Alle medewerkers vermeldden dit jaar bij de Blauwe Kiekendief de verhouding mannetje-vrouwtje. Wat dit laatste aangaat wil dit alleen maar zeggen dat dit van kiekendieven in ^okleed is. Hieronder kunnen dus jonge ^o66 zitten.

Resultaten

In het onderzochte gebied werden 493 roofvogels en 5 uilen aangetroffen (figuur 1).

Van de polder Hattum bij Oldebroek kon een deel wegens tijdgebrek niet worden geteld. De invloed van het ontbrekende deel op het totaalbeeld en de aantallen van het telgebied zijn te verwaarlozen.

De beide Flevopolders steken weer met kop en schouder boven de andere telgebieden uit. Vooral de Torenvalk, Blauwe Kiekendief en Buizerd waren veel aanwezig, waarbij moet worden opgemerkt dat de aantallen Torenvalken aanzienlijk lager waren dan in de twee voorgaande jaren.

Van de Flevopolders, alle jaren in hun geheel geteld, zijn de aantallen in figuur 2 opgenomen.


Dat er, net als bij eerder gehouden tellingen, weinig uilen werden waargenomen is niet verwonderlijk. Overdag zitten zij meestal goed verscholen in bosjes of begroeide greppels. Waarnemingen van uilen zijn toevalstreffers.

Figuur 1.

Trajekt	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Totaal
Buizerd	29	18	14	6	6	2	39	9	18	141
Ruigpootbuizerd	-	-	-	-	-	2	-	2	19	23
Blauwe Kiekendief	1	-	-	-	-	32	16	11	123	183
Bruine Kiekendief	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Torenvalk	6	6	9	3	3	30	14	16	53	140
Sperwer	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
Smelleken	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3
Velduil	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Kerkuil	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Totaal	37	24	24	9	9	66	70	39	220	498

Figuur 2.

Aantal exemplaren Torenvalken




In het aantal Blauwe Kiekendieven zet zich de in 1974 begonnen trend van toenemende aantallen voort. Deze ontwikkeling, die zich voornamelijk tot Zuidelijk- en Oostelijk Flevoland (figuur 3) beperkt, lijkt strijdig met het afnemende riet- en ruigte areaal.


Boven de nog aanwezige rietvelden of restanten hiervan worden nog steeds veel Blauwe Kiekendieven waargenomen. Met het ontwikkelen van de polders worden echter veel jonge bomen aangeplant en bij deze jonge bossen, die de eerste jaren een explosieve ontwikkeling van de kruidlaag hebben, houden zich de kiekendieven op.

Van de 183 Blauwe Kiekendieven die werden genoteerd bezaten er 154 het vrouwtjeskleed en 29 het mannetjeskleed. Voor de beide Flevolanden was het totaal percentage mannetjes 16 %.

In de winter '69/'70 werd gemiddeld 29 % gevonden, in '70/'71 29 % en in '71/'72 22 %. (Schipper 1975).



Figuur




De Buizerd was tijdens de eerste telling in 1972 in grote aantallen aanwezig. Met uitzondering van 1975, toen in het hele onderzochte gebied slechts 27 exemplaren werden gesignaleerd, lagen de aantallen in de andere jaren tussen de 120 en 150.

Op het vasteland zijn de schommelingen over de afgelopen 5 jaar groter geweest dan in Oostelijk Flevoland (figuur 4).

De aantallen die zijn ongenomen in het blokdiagram hebben betrekking op de gebieden die elk jaar werden geteld. Zuidelijk Flevoland is nog niet zo in trek. Wanneer de nu nog jonge bossen eenmaal op hoogte zijn gekomen zal het aantal ongetwijfeld toenemen.

Figuur 4.



Verklaring trajectcijfers:

- I : Kampen - Elburg
- II : Elburg - Harderwijk
- III : Harderwijk - Nijkerk
- IV : Nijkerk - Laren
- V : Naarden - Muiden
- VI : Oostelijk Flevoland, westelijk deel
- VII : Oostelijk Flevoland, oostelijk deel
- VIII : Oostelijk Flevoland, noordelijk deel
- IX : Zuidelijk Flevoland

Medewerking aan de telling werd verleend door: A.Bode, K.Breek, B.E.Cohen, E.Disselkoen-Piepers, O.de Graaf, F.Griffioen, J.A.Guldemon, J.Harder, A.Hartlief, F.Hoes, P.v.d.Poel, B.v.Poelgeest, H.W.Reddingius-Schreuder, L.F.Rijnja, F.de Roder, K.Schouten, H.M.Sitters, H.W.de Soete, K.Visser, Y.S.Vogel.

Geraadpleegde literatuur: Buurma, L.S. (zonder jaartal): Inter- en intraspecifiek vergelijkend onderzoek aan kiekendieven in Flevoland buiten de broedtijd. Doctoraal scriptie Biologisch Lab. V.U. A'dam.
Schipper, W.J.A., L.S.Buurma en PH.Bossenbroek (1975): Comparative study of hunting behaviour of wintering Hen Harriers *Circus cyaneus* and Marsh Harriers *Circus aeruginosus*. *Ardea* 63: 1-29.

D.A. Jonkers