

DE KOPERWIEK OP TREK

Het jaarlijkse evenement onder de vogels is weer in volle gang. Oktober is de trekmaand bij uitnemendheid en meestal bereikt de vogeltrek in de derde week van deze maand zijn hoogtepunt.

In deze tijd komen ook onze wintergasten, waaronder vogels die wij alleen in het winterhalfjaar hier kunnen waarnemen. Een van deze is de Koperwiek. Tijdens de trek komen verschillende lijsterachtigen bij ons op bezoek, het merendeel maar voor één of enkele dagen. Er zijn er echter bij die in Nederland blijven hangen en hier de winter doorbrengen. De Koperwiek is daar onder andere ook bij. De meeste exemplaren gaan echter door en zijn dan wel waarneembaar, al is het niet altijd met het oog.

Daar het een nachttrekker is, laten de meesten zich niet zien maar wel horen. Degene die in oktober tijdens een mooie windstille avond zijn oren de kost geeft, zal soms grote aantallen van deze vogels kunnen horen; de contactroep wordt namelijk regelmatig gegeven om het troepverband te kunnen bewaren. Ze kunnen echter niet in de lucht blijven en daarom zal het wel lukken om na een nacht met drukke trek de volgende morgen fouragerende Koperwieken in een weiland of park aan te treffen.



Koperwieken zijn van andere lijsterachtigen te onderscheiden door de lichte oogstreep en de roodkoperen okselvlek onder de vleugel en in de flank. Hij behoort tot de kleinste van deze soort die bij ons voorkomen.

Ze zijn gek op bessen en wanneer wij besdragende heesters in onze tuin hebben bestaat er een goede kans, dat u vooral wanneer het voedsel schaars wordt bij vorst of sneeuw, een Koperwiek van de bessen ziet snoepen. Niet alle bessen smaken de vogels; de minst smakelijke blijven het langst aan de struik. Als echter de nood aan de vogel komt, weet de Koperwiek deze wel te vinden.

Het is dus, zoals reeds gezegd, een wintergast, die niet in ons land broedt. Bij redelijk weer in februari bestaat de kans dat een aantal Koperwieken al weer naar het noorden trekt.

Wie iets van de vogeltrek wil zien, moet er nu op uit trekken of aan een excursie deelnemen. Wanneer wij de goede plaatsen eenmaal weten kunnen wij er veel van zien. Met een kleine groep of alleen zie je vaak meer dan wanneer je met een heel stel bent. Een goed plekje is de Gooimeerkust.

De vogels vliegen er langs, boven het water of het riet, terwijl soms grote troepen mezen zich door de langs de kust groeiende bomen verplaatsen. Een vogel waarvan de trek duidelijk is waar te nemen is de Boerenzwaluw. Hij trekt boven het water langs de kust. Deze trek is nu echter alweer voorbij. De spreeuwen zijn zich nog volop aan het verplaatsen. Wanneer u zich kort na zonsondergang heeft gestationeerd op het fietspad bij Huizen of op de hoogte van Magdalenen bij dit fietspad, dan kunt u de spreeuwen in golven over een breed front naar het zuiden zien gaan.

U moet echter geschikt weer afwachten, dat doen de vogels ook. Een niet geheel gesloten wolkendeek en een niet te harde wind uit westelijke richting is wel het meest geschikte weertype om vogels te verwachten.

Ook langs de Oostvaardersdijk is de trek soms mooi te zien, de Rietgorzen en vinkachtigen kunnen daar heel goed worden waargenomen. Ze vliegen meestal net achter de dijk. Ook de mezen zijn daar wel te volgen. Wanneer wij een plaats zoeken net voor het gemaal de Block van Kuffeler en het weer is geschikt, dan zullen we daar verschillende soorten zien overkomen, waaronder ook de Baardmannetjes die zich door hun drukke contactroep wel laten ontdekken.

Daarnaast ziet u waadvogels, ganzen en eenden in de plas zodat uw tocht bijna niet kan mislukken. In ieder geval; veel succes bij uw "trektocht".

K. Visser

¹⁵⁻⁸⁻⁷⁸ Torenvalken dood door muizentekort

ZEIST (ANP) - De grote sterfte onder de torenvalken is vermoedelijk een gevolg van een parasitaire ziekte, coccidiosis genoemd. Het Centraal Diergeneeskundig Instituut te Doorn heeft dit na een onderzoek van de dode vogels vastgesteld. De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels heeft meegedeeld, dat de ziekte wordt veroorzaakt door het veranderde voedselgedrag van de vogels. Ten gevolge van een slecht muizenjaar zijn de roofvogeltjes overgestapt op het nuttigen van ander voedsel. Zo zijn bij het onderzoek in Doorn in de magen grote hoeveelheden kevers aangetroffen die de parasitaire ziekte kunnen hebben veroorzaakt.

Het gaat voorlopig om een totaal van enkele honderden dode torenvalken die zijn aangetroffen op de Waddeneilanden, in Noord-Holland, Friesland, Gelderland en Utrecht.