

REKTIFIKATIE OP "GANZEN IN HET GOOI 1979-1980"

R.G. Moolenbeek

Als vervolg op het artikel van Trijnie Stoker over de ganzen in het Gooi verscheen in de Korhaan 15 nr. 2 het ganzenverslag over de winter 1979-1980. Bij de Rietgans staat op pp. 39 vermeld dat "De meeste vogels hebben een groot deel van de snavel licht en soms witte kollen. Het betreft dus de Grote (=Taiga) Rietgans en op pp. 40 staat "dat het ook hier om Grote Rietganzen gaat".

Nadere bestudering van de diverse ondersoorten aan de hand van enige artikelen, de balgenkollektie in het Zoologisch Museum te Amsterdam en enige draadslachtoffers van de Hilversumse Meent doen mij echter terug komen op bovengenoemde determinatie. De reden dat ik in eerste instantie met Taigarietganzen (Anser fabalis fabalis) dacht te maken te hebben baseerde ik op de vele exemplaren met behoorlijke gele snavels en de soms duidelijke aanwezig witte kollen. Museummateriaal en de draadslachtoffers van de Hilversumse Meent echter bleken meer tot de toendra ondersoort (of eigenlijk meer een intermediaire vorm tussen fabalis en rossicus) te behoren. De hoeveelheid geel op de snavels en de witte kollen zijn niet de juiste kenmerken om de ondersoorten te onderscheiden. Belangrijker is de hoogte en de vorm van de snavel. Komende winter zal ekstra aandacht aan deze kenmerken besteed worden en ik hoop dan in de toekomst nog eens uitvoeriger op deze materie terug te komen.