

GROENE SPECHT ALS BOSUILPROOI

Jelle Harder

Dit jaar, 1981, broedde er voor het eerst een Bosuil binnen het afgesloten gebied van het Laarder Wasmeer. Bij controle van een kast waar gewoonlijk een Holenduif in broedt bleek deze bezet te zijn door een Bosuil. Het nest bevatte op 14 maart eieren. Eerst op 23 april werd de kast opnieuw gecontroleerd. Aangezien de kast leeg was, het nestmateriaal nogal platgetrapt en er resten van prooien lagen werd aangenomen dat het broedsel succesvol zal zijn geweest. Bij nader onderzoek van de prooiresten werd al snel duidelijk dat er veerresten van een Groene Specht tussen zaten. Mij schoot op dat moment te binnen dat ik op 13 april niet ver van deze kast de schedel van een Groene Specht had gevonden. Toeval? Aangezien deze vogelsoort waarschijnlijk niet een alledaagse prooi van de Bosuil zal zijn heb ik dat eens nagezocht. In Ardea 60: 1-71 (1972) beschrijft C. Smeenk het voedsel van Bos- en Ransuilen in Twente. Bij de 444 vogels die hij in de prooiresten tegenkwam bleek de Groene Specht niet voor te komen. Wel soorten van gelijke grootte of zelfs groter, zoals Tortelduif, Houtduif, Dodaars, Kip, Fazant en mogelijk Waterhoen. Het handbuch der Vögel Mittel Europas, deel 9 pagina 605 vermeldt geen Groene Specht als prooi van de Bosuil. Wel worden genoemd Houtduif, Postduif, Patrijs, Gaai, Ekster, Waterhoen, Zwarte Kraai, Wilde Eend en Hazelhoen. Uiteraard zijn de genoemde prooi-soorten meer uitzondering dan regel. Een Groene Specht is dus geen grote bijzonderheid maar wel vermeldenswaard.