

BERGEENDEN IN HET GOOI, 1981

F van Klaveren

Inleiding:

In 1981 hebben wij ons werkgebied geïnventariseerd op het voorkomen van Bergeenden (*Tadorna tadorna*). Dit onderzoek sluit aan bij het totaal onderzoek in de provincie Noord-Holland. De stichting "Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland" (S.V.N.) heeft namelijk afgelopen jaar hun werkgebied onderzocht. Met deze inventarisatie van 't Gooi hopen wij het totaal beeld van Noord-Holland te completeren.

Voorafgaand aan het eindverslag over het voorkomen van de Bergeend in het Gooi, dat hopelijk dit jaar (1982) afgerond zal worden, geef ik hierbij vast de voorlopige resultaten van de tellingen die in 1981 gehouden zijn.

Methode

Gedurende het broedseizoen tot in de nazomer zijn voortdurend waarnemingen gedaan van jongen (pullen), gepaarde Bergeenden en volwassen vogels (adulten) met hun jongen. Deze waarnemingen zijn na afloop bekeken en per gebied (bv. landgoed) vergeleken om zodoende dubbelstellingen zoveel mogelijk te voorkomen. Daar ook onvolwassen Bergeenden gepaard kunnen zijn (Kraak, WK, 1978), werden alleen de adulten met hun jongen als broedgeval gemeld.

Resultaten

Gebleken is dat ons werkgebied het afgelopen jaar (1981) goed bezocht is geweest door de Bergeend. In totaal hebben 39-45 paar in het Gooi gebroed. Gebleken is dat de gebieden rondom Hilversum en langs het Gooimeer het meest in trek zijn geweest. Schematisch gezien geeft dat het volgende beeld:

Broedparen van de Bergeend in het Gooi, 1981

'sGravelandse Landgoederen	16
Kortenhoeftse plassen	3
Laarder wasmeer	5
Hilversums wasmeer	3
Anna's hoeye	1
Eindegooi ¹⁾	+1
Limiten	6
Naardervesting	1
De Beek (Blindeninstituut)	0-2
Naardermeer	2-6
Theosophius centrum (oud Naarden)	1-2
Totaal	39-45

I) Inventarisatie Eindegooi, 1980, D.A. Jonkers.

Alleyn (1971) noemt voor de periode 1967-1970 de Bergeend een vrij schaarse broedvogel, hetgeen 51-500 broedparen inhoudt. Of we in 1982 tot het minimale aantal van 51 broedparen zullen komen hangt voor een deel af van de vraag of de Bergeenden in de gebieden Muiderberg, de Gooimeerkust van Huiszen tot de Eemmond, de Eempolder (inclusief de Gooiersgracht), de heidevelden (mn Westerheide) en de bossen ten oosten van Hilversum (Cronebos, Dassenbos, Smithuizerbos) broeden. Van deze gebieden zijn namelijk geen of weinig gegevens van recente broedresultaten bekend. Hoogstwaarschijnlijk broeden de Bergeenden niet (meer) in de meeste van de genoemde gebieden, maar toch worden er nog wel broedgevallen over het hoofd gezien. Het kan dus de moeite lonen meer op de Bergeenden in deze gebieden te letten.

Dankwoord

Met dank voor de gegevens voor 1981 aan: J. en H. Harder, W. Kraak, R. Moonbeek, G. Mijnhout, J. v. Woersum en W. J. R. de Wijs.

Literatuur

Alleyn, W. F. et al, 1971, Avifauna van Midden-Nederland, Assen.

Kraak, W. K. 1978, Vogels in het Gooi, uitgave VWG het Gooi e.o.

Jonkers, D. A. 1980, De broedvogels van Eindhoven in 1980, Korhaan nr 4,
jrg 15, 1981.

Waarnemingen archief Vogelwerkgroep 't Gooi e.o.

Wat te doen met uw Bergeend waarnemingen?

Graag zou ik voor het samenstellen van het eindverslag, alle beschikbare gegevens ontvangen van broedgevallen, grote aantallen, baltsgedrag, winterwaarnemingen en eventueel opmerkelijke gedragingen. Indien u Bergeenden ziet waar u ze nog nooit waargenomen heeft, bel dan even of schrijf,

Fred van Klaveren

Berkenhof 3

Kortenheef

035-61428