

EKSTERS KOMEN AF OP PLEKKEN WAAR HEIDE IS AFGEBRAND

Jaap Taapken

Begin maart 1985 werden grote gedeelten van de Hoorneboegse Heide door de Stichting Gooisch Natuurreservaat afgebrand. Of dit afbranden nu zo goed is voor de bodemfauna wil ik hier even buiten houden, ofschoon ik op een voordracht tijdens het heide-symposium wel heb horen vertellen dat de bodemfauna na het afbranden voor enkele jaren totaal is ontregeld.

Het viel mij op dat de afgebrande plekken (die deels zwaar en deels licht afgebrand waren) de voorkeur hadden van Eksters. Het was duidelijk dat de afgebrande plekken zelfs Eksters aantrokken, want ik zag vaak vrij grote troepjes daar voedsel zoeken. In het begin dacht ik dat door de warmte van het afbranden veel dieren voortijdig uit de grond gekomen waren, waardoor ze een welkome buit voor de Eksters vormden. Maar de interesse voor die plekken bleef ook nog maanden daarna en taande toen hier en daar verschillende grassoorten hoger begonnen op te groeien.

De aantallen, die ik op de afgebrande plekken waarnam, varieerden van kleine troepjes van 5 tot 10 exemplaren tot troepen van 16 tot 28 stuks. Meestal hebben zich in april toch al volop de paren gevormd. Omdat wij ruim twaalf jaar zeer regelmatig de Hoorneboegse Heide bezoeken konden wij met zekerheid vaststellen dat de afgebrande plekken ook Eksters van elders (vermoedelijk van de wijde omgeving) hebben aangetrokken. Thans (eind juli 1985) zijn ze nog wel op de afgebrande plekken bij voorkeur te vinden, maar hun aantal heeft weer normale vormen aangenomen.

De Eksters op de Hoorneboegse Heide hebben mijns inziens een zeer nuttige functie. Ik heb talloze malen de proef op de som genomen. Op deze heide ruimen de Eksters binnen enkele dagen (vaak al binnen twee à drie dagen) alle uitwerpselen van honden op. Natuurlijk zijn daar uitzonderingen op, want uitwerpselen die er niet gezond uitzien of van honden die geen goed voedsel hebben gekregen blijven onaangeroerd.

Overigens staat de Ekster bekend als vogel die voedsel zoekt op grazige, wat zandige open plekken en bestaat het voedsel van Eksters, volgens wetenschappelijk onderzoek, voor meer dan 90 % uit schadelijke insecten.

