
In 1994 verrichtte Marc van Houten op verzoek van Natuurmonumenten een broedvogel-inventarisatie in het noordelijke deel van het toekomstige weidevogelreservaat Noordpolder te Veld/Maatpolder. Hij stelde achttien soorten broedvogels vast. Hierbij een samenvatting van het rapport.

Pieter Schut

Broedvogels van Maatpolder en Noordpolder te Veld in 1994

Het doel van de inventarisatie was om een inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de broedvogelstand en het broedsucces daarvan te achterhalen. De nadruk werd hierbij gelegd op de weidevogels, hoewel alle broedvogels werden gekarteerd. De inventarisatie leverde achttien verschillende broedvogelsoorten op. Ten opzichte van inventarisatie uit 1989 en 1992 heeft de stand zich positief ontwikkeld. Zo zijn Kievit, Grutto en Tureluur duidelijk toegenomen. Dit geldt ook voor de Slobeend, terwijl de Zomertaling terug is van weggeweest.

Een soort, de Waterhoen, is als broedvogel verdwenen. Erg alarmerend is dit niet, aangezien deze soort wel broedt in een direct aangrenzend gebied. Zie voor meer informatie hierover het artikel van Marc van Houten over de Waterhoen, elders in deze Korhaan.

Onder deze achttien broedvogels bevinden zich elf soorten 'primaire weidevogels', soorten die overal in Nederland in grasland broeden en twee soorten 'secundaire weidevogels', soorten die lokaal in Nederland in grasland broeden.



Zomertaling

Vermeldenswaardig is dat de Zomertaling, de Tureluur en de Grutto voorkomen op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten in Nederland (Osieck & Hustings 1994). Dit zijn soorten waarvan het aantal in recente tijd sterk is achteruitgegaan. De Scholekster en de Grutto komen voor op de

Blauwe Lijst. Dit zijn soorten die op wereldschaal bedreigd zijn.

De vaststelling van een zeker territorium voor de Zomertaling mag bijzonder genoemd worden. De soort werd in 1989 voor het laatst gemeld als broedvogel in het onderzoeksgebied. Een roepend (lees: krakend) mannetje en een telronde later een opvliegender vrouwtje op praktisch dezelfde plaats, begin mei, gaven zekerheid. Het is te hopen dat deze liefhebber van nat grasland voor Eemland behouden kan blijven.

Landelijk wordt het aantal broedparen op 1000-1900 geschat. Door dit voor ons land kleine aantal mag de Zomertaling dan ook met recht een bedreigde soort worden genoemd.

Om de onderzochte gebieden in de Maatpolder en de Noordpolder te Veld ook in de toe-

komst te behouden als reservaat met zowel ornithologische als botanische waarde, worden de volgende aanbevelingen gedaan:

- De waterstand hoog opzetten.
- Aanleggen van greppels en sloten met flauw hellende oevers. Dit biedt goede broedomstandigheden.
- Gebruik van stalmest. Dit verbetert de bodem voor zowel planten als insecten en dus uiteindelijk ook voor de vogels.
- In stand houden van overhoekjes en rietland.
- Voorkomen van verruiging.
- Beweiding en hooiland wisselen.
- Beweiding met zo weinig mogelijk dieren. Dit biedt ruimte voor weidevogels.
- Niet maaien voor 1 juli. Indien Kemphaan of Kwartelkoning aanwezig zijn als broedvogel moet niet voor 20 juli worden gemaaid. Beide soorten zijn overigens in 1994 als niet-broedvogel in de onderzochte gebieden waargenomen.
- Tegengaan van recreatie ter voorkoming van onrust.

Het uitgebreide rapport "De broedvogels van de Noordpolder te Veld/Maatpolder in 1994" is mooi uitgevoerd en voorzien van illustraties van Gerard de Vries. Wie meer wil weten dan in deze globale samenvatting is vermeld kan het rapport voor f. 6,50 (inclusief verzendkosten) bestellen bij Marc van Houten, telefoon: 02154-15603. De opbrengst is bestemd voor de vogelwerkgroep.

Literatuur

Houten, M. van, 1994. De broedvogels van de Noordpolder te Veld/Maatpolder in 1994. Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, Uitgave 94.

Osieck, E.R. & F. Hustings, 1994. Rode Lijst van bedreigde soorten en Blauwe Lijst van belangrijke soorten in Nederland. Vogelbescherming Nederland, Zeist.