

In 1994 werden opnieuw op 26 teldata in Noord- en Zuidpolder en Oostermeent de vogels van de Eempolders geteld. Van 118 soorten werden totaal 110.312 vogels gezien. Meer soorten, maar minder vogels dan in het voorgaande teljaar. Nico Klippel zet opnieuw de cijfers van ons eigen continue-onderzoek op een rij.

Nico Klippel

Eempoldertellingen in 1994

De belangrijkste uitkomsten over 1994 (ter vergelijking: tussen haakjes =1993) zijn:

Van 118 (113) soorten werden totaal 110.312 (126.479) vogels gezien. Qua soorten komt dit aantal weer in de buurt van 1992 (117). Qua aantal vogels was het lager (125.144).


Helaas zijn van 4 (2) tellingen van de totaal 78 tellingen de gegevens niet boven tafel gekomen. Dit is jammer (eigenlijk doodzonde), te meer waar in 3 van de gevallen het absoluut zeker was dat er wel werd geteld. Laten we proberen in 1995 dit aantal weer te minimaliseren. Snel insturen helpt. Aan de tellingen is door 32 (31) tellers meegewerkt.

Top Tien

Het totale aandeel van de top tien (83,8 %) nam ten opzichte van 1993 (84,7 %) af. Hetzelfde was het geval in 1993.

Deze teruggang kan voornamelijk toegeschreven worden aan een duidelijk minder aantal waargenomen Spreeuwen: 29550 ten opzichte van 41960. Een "wolk" Spreeuwen meer of minder in de trek/winterperiode maakt hier een groot verschil. Hetzelfde kan ook bij de Kievit voorkomen. In totaal aantal bleef de Kievit ongeveer gelijk en met name in de broedperiode was er een gelijk patroon.

Binnen de top 10 vonden er weer belangrijke verschuivingen



Roerdomp

plaats, waarbij wel kan worden aangetekend dat de top 10 van 1993 nog geheel in de top 20 van 1994 aanwezig was.

Nieuwkomers in de top 10 waren Stormmeeuw, Goudplevier (in 1993 nog op positie 24) en de Houtduif.

Bekend is dat de Goudplevier in zeer wisselende aantallen aanwezig kan zijn.

Hetzelfde geldt ook voor de Kleine zwaan die in rangorde slechts één plaats terugliep, maar qua aantal meer dan halveerde. Detailanalyse geeft echter aan dat de soort in een wat kortere periode en in meer wisselende aantallen aanwezig was. De maxima lagen echter ongeveer gelijk, zodat er vermoedelijk geen sprake van verandering was.

Opmerkelijk was de toename bij de Grauwe gans en hoewel buiten de top 10 ook de Kolgans. Mogelijk dat de aangepaste beheersmaatregelen in een deel van het gebied, namelijk het ver-

hogen van de waterstand naar een meer "ouderwets" peil, hier van invloed waren. Laten we dat hopen.

Met de terugkeer van de Stormmeeuw in de top 10 kwam de soort weer terug bij de positie die zij ook in voorgaande jaren innam. De Kokmeeuw bleef daarentegen ongeveer gelijk 18392 (18586). De Meerkoet liep wat terug. Waar winnaars zijn, zijn er ook verliezers.

Uit de top 10 verdwenen de Grutto, Zwarte kraai en de Kauw. Waar vorig jaar de Kauw de Zwarte kraai wat verdrong, was dit in '94 beslist niet het geval. De Zwarte kraai bleef nagenoeg constant 1209 (1355), terwijl de Kauw weer sterk terugviel 948 (1725).

Hoewel de Wilde eend in rangorde daalde 9 (6), nam zij in aantal toe 2346 (2055). De Houtduif kwam na in '93 uit de top 10 verdwenen te zijn, weer terug, zowel in aantal 1721 (1292) als in rangorde 10 (12). De Houtduif gaf echter weer een omgekeerd beeld: 440 (825).

Als buiten de top 10 naar verschillende specifieke soorten wordt gekeken, kunnen de volgende opmerkingen worden geplaatst:

Grutto: Waar in '92 en '93 de soort toenam, gaf '94 een teruggang te zien 1422 (2046).

Graspieper: Lichte toename tot 1005 (906). Toename voornamelijk veroorzaakt door meer waarnemingen tijdens de winterperiode.

Scholekster: ongeveer gelijk aantal 983 (906).

Veldleeuwerik: Toename in aantal 958 (909). Toename voornamelijk veroorzaakt door meer waarnemingen tijdens de winterperiode, zoals ook bij de Graspieper het geval was.

Wulp: Duidelijke afname 544 (1088). De Regenwulp gaf daarentegen weer een lichte toename te zien 49 (36).

Tureluur: 254 (324). De soort was hiermede weer terug op niveau van '93 (253).

Gele kwikstaart: Toename qua aantal 93 (54)

Kemphaan: Het aantal waarnemingen liep verder terug tot 70 (206). De Kemphaan wordt al jaren in de Eempolders uitsluitend tijdens de trek waargenomen.

Oeverzwaluw 4 (1).

Nijlgans 76 (39). De soort lijkt zich nu ook definitief in de Eempolders gevestigd te hebben.

Niet in 1994

De soorten die wel in 1993 en niet in 1994 werden waargenomen, waren:

Kleine plevier, Barmsijs, Grasmus, Bonte vliegenvanger, Boomvalk, Rode wouw, Kleine rietgans, Casarca, Grote bonte specht, Middelste zaagbek, Staartmees, Baardmannetje en Frater.

Nieuw in 1994

De soorten die in 1994 werden waargenomen en niet in 1993, waren (in aflopende volgorde qua aantal):

Zwarte stern, Keep, Sijs, Kleine strandloper, Pijl-

staart, Noorse gele kwikstaart, Dwergstern, Lepelaar, Bonte strandloper, Zwartkop, Ooievaar, Purperreiger, Smelleken, Turkse tortel, Roerdomp, Grote karekiet, Goudhaantje en Boomkruiper.

Conclusie

De meeste ontwikkelingen qua waarnemingen waren voorspelbaar, maar er waren ook veel onduidelijkheden en verrassingen. Doorgaan met de tellingen blijft daarom zeer gewenst. Misschien moet wel overwogen worden om tot een andere <meer gedetailleerde> indeling te komen. Dit omdat er in het gebied een duidelijke scheiding in beheer plaatsvindt.

	1993 Totaal		1994 Totaal		Noord		Zuid		Oost	
	Aantal	Nr	Aantal	Nr	Aantal	Nr	Aantal	Nr	Aantal	Nr
Spreeuw	41960	1	29550	1	12147	2	11709	1	5694	1
Kievit	26386	2	24522	2	14036	1	7210	3	3276	2
Kokmeeuw	18586	3	18392	3	7383	3	9637	2	1372	3
Stormmeeuw	1173	13	3701	4	2591	8	1005	7	105	18
Kleine zwaan	8096	4	3378	5	1622	6	1749	4	36	35
Grauwe gans	1640	9	3132	6	2741	4	33	37	378	8
Meerkoet	3255	5	3089	7	1332	9	1412	5	345	11
Goudplevier	683	24	2616	8	1440	7	1	79	1175	4
Wilde eend	2055	6	2346	9	887	10	994	8	465	6
Houtduif	1292	12	1721	10	320	18	1187	6	214	13
Kolgans	503	26	1553	11	1342	8	200	21	11	53
Grutto	2046	7	1422	12	468	13	378	16	576	5
Boerenzwaluw	1308	11	1371	13	410	14	584	11	377	9
Zwarte kraai	1355	10	1209	14	524	11	519	12	166	16
Knobbelzwaan	1000	16	1062	15	367	15	659	9	36	34
Graspieper	906	20	1005	16	508	12	226	19	271	12
Scholekster	909	18	983	17	299	19	510	13	174	15
Veldleeuwerik	853	22	958	18	348	16	148	24	462	7
Kauw	1725	8	948	19	332	17	591	10	25	40
Smient	978	17	872	20	9	57	491	14	372	10
Totaal	107104		92447		44499		34937		13060	
Top 10										
Totaal	126479		110312		51411		41725		17619	
Aantal soorten		113		118		97		86		92

Telresultaten in de Eempolders in 1993 en 1994.