

Al vijf jaar werken vogelaars uit onze werkgroep samen met boeren in de Eempolders om weidevogels te beschermen. Tijd dus voor een lustrumverslag van de Weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied. De redactie van De Korhaan maakte een samenvatting.

Marc van Houten

Vijf jaar bescherming van weidevogels in Eempolders

Al vijf jaar worden er in het graslandgebied ten westen van de rivier de Eem, in de provincies Noord-Holland en Utrecht, weidevogels beschermd. In 1992 is in de Blaricumse Oostermeent bescheiden gestart. Drie enthousiaste weidevogelbeschermers beschermden toen zo'n 15 hectare grasland bij één boer. Sinds 1995 valt de groep onder de Subgroep Avifauna van de vogelwerkgroep. En sinds dat jaar wordt er zowel in de Ooster-


meent (Noord-Holland), als in de Noordpolder te Veld en de Maatpolder (Utrecht) aan weidevogelbescherming gedaan. In totaal gaat het nu om tien beschermers die bij zeven boeren 85 hectare bewaken, een vervijfvoudiging dus ten opzichte van het begin. En datzelfde geldt ook ruimschoots voor gevonden legfels. In 1992 waren dat er 20; in 1996 121.

Die ontwikkelingen vallen dus positief uit voor de doelgroep: de weidevogels. Wat echter ook belangrijk is, is dat het wederzijdse begrip tussen de meewerkende boeren en vogelbeschermers verder toeneemt.

Weer

De droogte in combinatie met de langdurige winter- en voorjaarskoude was in 1996 zeer abnormaal. Het KNMI heeft tussen juli 1995 en april 1996 iets meer dan de helft (330 mm.) neerslag gemeten die normaal gesproken valt (620 mm). April 1996 was de droogste aprilmaand van deze eeuw.

Door de vorst in de grond en de extreme droogte konden de kieviten en later ook de grutto's op de weilanden nog niet volop voedsel vinden. Gevolg hiervan was dat kieviten en zelfs grutto's op de meest vreemde plaatsen gingen foerageren, zoals in wegbermen, bosranden, plantsoenen en grotere tuinen.



Scholeksters

Door de lange vorstperiode konden de zware machines al vroeg in het jaar het land met mest injecteren. Hiermee was het merendeel van de mest al voor eind maart de grond in. De meeste boeren waren dus al klaar met mestrijden voor het broedseizoen echt begon. De meeste boeren zijn pas begin juni massaal gaan maaien, bijna een maand later dan in 1995. Daarom hebben de boeren niet om nesten heen hoeven maaien. Ook de koeien gingen later naar buiten, wat ook goed is voor de broedende weidevogels.

Resultaten

Er werden dit jaar 121 legsels van weidevogels gevonden. Hiervan behoorde 66 procent toe aan de Kievit en 26 procent aan de grutto. Van deze legsels is 69 procent uitgekomen, wat redelijk te noemen is. Van 12 procent van de legsels zijn de lotgevallen onbekend. Bij de oorzaken van verloren gaan van legsels staat predatie met 12 procent veruit

Weidevogelbeschermingsgroep Westelijk Eemgebied



voorop. Het gaat hier om eierroof door bijvoorbeeld kraaien, meeuwen en marterachtigen. De conclusie mag zijn dat de verliezen door agrarische activiteiten en beweiding, mede dankzij de nestbescherming, vrijwel nihil zijn.

Dit jaar werden 37 legsels onder de beton-ijzeren nestbeschermers geplaatst. Van deze 37 kwamen er 31 legsels uit. (Zie tabel 1).

Tabel 1.

Legsels onder nestbeschermers.

Vogelsoort	Legsels	Legsels Uit
Scholekster	1	1
Kievit	22	21
Grutto	13	8
Tureluur	1	1

Door het bekijken van het overzicht van vijf jaar weidevogelbe-

scherming, westelijk van de rivier de Eem, kunnen we concluderen dat "we" in de lift zitten. Meer medewerkers, meer boeren, meer beschermde hectares en meer beschermde legsels.

Natuurlijk willen we graag gezamenlijk verder groeien. Uit de onlangs gehouden enquête onder de leden van de vogelwerkgroep is gebleken dat veel mensen interesse hebben in het nestbeschermingswerk. Enkelen van hen zijn inmiddels al actief betrokken bij dit werk. Anderen zijn dit voorjaar ook van harte welkom.

Marc van Houten,
Dovenetelhof 26,
3742 EH Baarn.
Tel.: 035-5415603.



De Keverdijkse- en Overscheense Polder, vanaf de Meerkade bij het Naardermeer