

---

**In 2002 werd door de groep Eempoldertellers alweer voor het dertigste jaar geteld. Een onderzoek dat al zo lang loopt is een unicum in Nederland. In totaal werden in 2002 in het westelijke deel van het Eemland, met name de Noordpolder te Veld, de Zuidpolder te Veld en de Oostermeent, 128.000 vogels geteld.**

C.L. Joziasse

## Eempoldertellingen 2002

In dit kort verslag wil ik graag een beeld schetsen van de ontwikkelingen in de vogelpopulatie van dit nog steeds unieke gebied. Uniek vanwege de schaal-grootte en de relatieve rust. Vele vogelaars tellen in dit gebied, sommigen zelfs vanaf het begin, een hele prestatie! De komende dertig jaar zal in het Eemland de ontwikkeling van het gebied niet stil blijven staan. Een reden te meer om dit kritisch te volgen en zeker te blijven tellen. Zo kan men zowel positieve als negatieve gevolgen van veranderingen vaststellen en staven met harde cijfers, met als doelstelling de populatie en de diversiteit aan vogelsoorten voor dit gebied te behouden en zo mogelijk uit te breiden. Nico Klippel heeft begin dit jaar het vaandel aan mij overgedragen. Ik ervaar het dan ook als mijn verantwoordelijkheid deze tellingen in stand te houden. Nico, hierbij bedank ik je voor je kennis en inzet.

Onderstaande gegevens zijn een voorproefje op het nog te verschijnen verslag over de periode 1991-2002. Ik wil mij in dit korte overzicht beperken tot enig inzicht in de beschikbare informatie. Interpretaties en conclusies komen aan bod in het verslag 1991-2002. Het aantal waargenomen soorten van 2002 komt op 110. Dit is iets minder dan voorgaande jaren. Het totaal van 128.000 vogels is behoorlijk

minder dan het jaar ervoor. Er is een negatieve trend waar te nemen in de periode 1998-2002. Ruim 80% van dit totaal zijn te plaatsen in de onderstaande top 10.

Soort	Aantal
Spreeuw	31199
Kievit	27221
Grauwe Gans	12760
Kokmeeuw	12700
Knobbelzwaan	4783
Meerkoet	4769
Kolgans	3855
Wilde Eend	3066
Grutto	2978
Kleine Zwaan	2723

Deze tellingen zijn in 1973 gestart om de weidevogels, waar dit gebied zo belangrijk voor is, in aantal en ontwikkeling te volgen. Zo kan men de relatie tussen vogelpopulatie en gebiedsontwikkelingen in kaart te brengen. Voor de volgende soorten is in de periode 1998-2002 een opgaande trend (periode van de afgelopen vijf jaar) waar te nemen: wintertaling, slobbeend, grutto, kempiaan, tureluur, gele kwikstaart. Een neergaande trend geldt voor de kievit en zeer sterk voor de wulp en veldleeuwrik. Gelijkblijvers of soorten met sterke schommelingen zijn scholekster, watersnip en de graspieper.

Naast deze soorten heeft het gebied ook grote waarde voor de

overwinteraars zoals ganzen en met name de kleine zwaan.

De knobbels, grauwe-, Canadese- en brandganzen geven een opgaande trend weer. Helaas is deze ontwikkeling tegengesteld voor de wilde zwaan en kolgans. Qua aantallen blijven smient en kleine zwaan ongeveer gelijk.

Het aantal waarnemingen van buizerd en torenvalk is drastisch gedaald. Anderzijds worden havik, slechtvalk en wespendif vaker gezien. In dit jaar zijn geen kramsvogels en koperwieken waargenomen. Voor de huiszwaluwen was dit een topjaar. Daarnaast is incidenteel de ortolaan waargenomen.

Voor zover dit beknopt verslag. Wilt u als beginnend vogelaar of ornitholoog mee doen met deze tellingen neem dan contact met mij op. U kunt bij mij ook het aankomend - of al uitgebrachte verslagen bestellen.

C.L. Joziasse, Coördinator Eempoldertellingen.  
Adres: Horrewaarde 39, 1399 HV Muiderberg, (0294) 26 38 21, e-mail: cjoziasse@hotmail.com.