

De brandgans in de westelijke Eempolders

Een aanvulling op het artikel in het julinummer van Jan Mooij

Sytze Poelstra

Aangezien het Eempoldergebied een van mijn favoriete vogelgebieden is, lees ik de voortreffelijke verslagen van Jan Mooij over het aantalsverloop van de diverse soorten hier altijd met meer dan gewone aandacht. Zo ook het verslag over het voorkomen van de brandgans in de westelijke Eempolders in de Korhaan, jaargang 47 nummer 2, blz. 60 en 61. Hier viel mij de volgende zinsnede op (citaat) : *“Aanwijzingen dat er in de polders gebroed wordt hebben we niet”*.

Daarover valt vanuit mijn eigen waarnemingen nog wel iets ter aanvulling op te merken.

Op 24 augustus 2008 (!) bespeurde ik in het Eempoldergebied tussen Eem en Meentweg (Eemnes) twee paartjes brandganzen die door respectievelijk 2 grote juvenielen en 3 kleine pulli werden vergezeld ; volgens mij leidt het geen twijfel dat deze jongen in dit gebied waren uitgebroed en groot gebracht.

Kun je hier nog van op zich staande gevallen spreken - en in de daarop volgende jaren zijn mij inderdaad hier geen broedgevallen van

deze soort bekend - het afgelopen broedseizoen was de situatie al weer heel anders, met name in het gebied dat bekend staat als de Oostermeent/de Kampen, dat ook in de verslagen van Jan wordt meegenomen. In de kuststrook van dit gebied, grenzend aan het Eemmeer, nam ik op 6 juni jl. viert paartjes brandganzen waar met elk drie tot vijf pulli. En op 13 juli jl. was in diezelfde kustzone een gezelschap van zo'n 30 brandganzen aanwezig en aan het verenkleed te zien waren er zeker vrijwel volgroeide juveniele exemplaren bij ! Daarmee lijkt het mij duidelijk dat deze soort als broedvogel van het gebied kan worden geboekstaafd, zij het dan dat niet zeker is of hij daar elk jaar zal gaan broeden. Grappig was dat daar op diezelfde 13e juli ook een tweetal kolganzen werd waargenomen (witte kol, buikstrepen en kenmerkende roep, alles klopte!), erg vroege wintergasten? Benieuwd welke perspectieven dat gaat openen...?