




Stadia-diagram /
Life cycle diagram
(respectively egg, caterpillar,
pupa, imago)



Vliegtijd /Flight period



Trend 1900-2000



Mobiliteit, verspreiding en trend

Het dambordje staat in de literatuur vermeld als honkvast. Toch zijn er diverse meldingen van zwervende vlinders, ook over een grotere afstand. (MAES & VAN DYCK 1999).

Het dambordje komt in grote delen van Zuid- en Midden-Europa algemeen voor. Op het Iberisch schiereiland wordt hij vervangen door het Spaans dambordje *Melanargia lachensis*. Nederland ligt aan de noordrand van het verspreidingsgebied en hier is het een onregelmatige standvlinder die met name in het zuiden is gezien. Tot de jaren dertig van de vorige eeuw heeft de soort zich op tal van plaatsen tijdelijk gevestigd, maar na een aantal jaren verdween zo'n populatie weer. De meeste waarnemingen kwamen ook toen al van de Zuid-Limburgse kalkgraslanden. Verder heeft de soort populaties gehad op de Veluwe, in de Achterhoek en in Twente.

Ook in de jaren negentig heeft de soort zich vermoedelijk zo nu en dan in Nederland voortgeplant. Zo zijn er in de

periode 1979-1982 in De Braak bij Groningen dambordjes gevonden. Ook in Zuid-Limburg zijn er tweemaal grotere aantallen van deze vlinders gezien, wat wijst op voortplanting. Daarnaast zijn er verspreid over het hele land, maar vooral in Zuid-Limburg, zwervende individuen gevonden, sinds 1990 zo'n dertig exemplaren. De dichtstbijzijnde stabiele populatie is te vinden op het Belgische deel van de Sint-Pietersberg, op minder dan één kilometer van de Nederlandse grens. (AKKERMANS ET AL. 2001).

Bescherming

Het dambordje is een zeer zeldzame onregelmatige standvlinder. Op Europese schaal is hij niet bedreigd en over het algemeen is het voorkomen stabiel. In België gaat de soort achteruit en staat op de Vlaamse en Waalse Rode Lijst. Ook in Duitsland gaat hij achteruit, maar in de Eifel vliegt hij bijvoorbeeld nog in grote aantallen. In Groot-Brittannië vliegt hij op veel plaatsen in Zuid-Engeland en is het voorkomen stabiel. In Frankrijk is het dambordje een algemene vlinder die in bijvoorbeeld wegbermen gevonden kan worden. (WARREN ET AL. 1997).

Omdat het voorkomen op dit moment niet stabiel is, is het niet zinvol om specifieke beschermingsmaatregelen te treffen.

Toekomst

Het is onbekend waarom het dambordje geen permanente populaties in Nederland heeft of heeft gehad. Wellicht kan deze soort profiteren van het warmer wordende klimaat en een regelmatig standvlinder worden.

SUMMARY

Marbled White *Melanargia galathea*

Melanargia galathea is an irregular resident. During the last century, it established itself sporadically here, mostly in the south of the country. There were several temporary populations up to the 1930s, as well as some in the eighties and nineties, mostly in the province of Limburg. Vagrants are sighted each year, in total 30 individuals since 1990. Several species of grass serve as larval foodplant.

DEZE SOORT IS GESPONSORD DOOR:
Antoinette Verburg (Utrecht) en
Coen Bommel (Ede).