

Koningspage *Iphiclides podalirius*



De koningspage wordt gevonden in geheel Zuid- en Mid-den-Europa. De soort staat bekend als vrij honkvast. De dichtstbijzijnde populatie bevindt zich in het Rijn- en Ahrdal, ten zuiden van Bonn en Wallonië, waar het een zeer zeldzame soort is. Zowel in Duitsland als in Wallonië gaat de soort achteruit. (BINK 1992).

De waardplanten zijn sleedoorn en andere *Prunus*-soorten. De eitjes worden afgezet op bladeren van kleine struikjes. De vlinders leven in heuvelachtige gebieden op warme en droge plaatsen, vooral in open terreinen met vrijstaande struiken en ruigte. De soort vliegt in één tot drie generaties en overwintert als pop. In Noordwest-Europa vliegt hij in twee generaties, de tweede is doorgaans vrij klein. Zwervers die in Nederland worden gezien, zijn van de eerste generatie die in mei en juni vliegt of van de tweede generatie die in augustus en september vliegt. De soort wordt in de literatuur vermeld als weinig mobiel. (BINK 1992).

De koningspage is een zwerver die bijna vijftig maal in Nederland is waargenomen. De eerste bekende waarneming stamt al uit 1789 en is gedaan bij Doesburg (GE). De volgende is uit 1793 bij Noordwijk (ZH). Voor 1800 waren er dus al twee koningspages gevonden, terwijl er geen koninginnenpage van voor 1800 bekend is. De laatste jaren wordt gemiddeld één individu per jaar gezien, in 2003 waren het er vier. De vroegste en laatste waarnemingsdatum zijn respectievelijk 20 mei (1999 Oudenbosch NB) en 19 september (1993 Broekpolder ZH). Ongetwijfeld heeft het grootste deel van deze waarnemingen betrekking op vlinders die op eigen kracht naar Nederland zijn gevlogen, maar de koningspage wordt ook wel eens gekweekt. (LEMPKE 1972).

SUMMARY

Scarce Swallowtail *Iphiclides podalirius*

Iphiclides podalirius is a vagrant. There have been nearly fifty sightings.

Veengeeltje *Colias palaeno*



Het veengeeltje - vroeger veenluzernevlinder geheten - komt voor in Noord- en Centraal-Europa. In België kwam hij vroeger voor in de Hoge Venen, maar is daar sinds 1950 verdwenen. Ook in Duitsland is de soort op veel plaatsen verdwenen. De dichtstbijzijnde populaties vliegen nu in de Jura en de Vogezes.

De waardplant is rijsbes *Vaccinium uliginosum*, een plant die in Nederland alleen op Terschelling en bij Winterswijk voorkomt. In Centraal-Europa leeft de vlinder in open bossen aan de randen van hoogvenen. Hij vliegt in één generatie tussen midden juni en eind augustus en overwintert als halfvolgroeide rups. In de literatuur wordt de soort vermeld als vrij honkvast. (BINK 1992).

Het veengeeltje is als dwaalgast driemaal in Zuid-Limburg waargenomen: in juni 1924 bij Gulpen (één individu), in juli 1925 bij Gulpen ('in aantal', waaronder 4 mannetjes en 3 vrouwtjes) en in juni 1945 bij Kerkrade. De waarnemingen bij Gulpen in twee opeenvolgende jaren kunnen geen betrekking hebben op een tijdelijke vestiging: de waardplant ontbreekt daar. Omdat de Belgische populatie is verdwenen, is de kans gering dat deze vlinder ooit nog in Nederland wordt gezien. (BENTINCK 1929)

SUMMARY

Moorland Clouded Yellow *Colias palaeno*

Colias palaeno is a vagrant. It has been seen three times in the south of the province of Limburg. Its larval foodplant *Vaccinium uliginosum* is extremely rare in the Netherlands. There is little likelihood of this species being seen here again, as the neighbouring Belgian population has disappeared.