

Tweekleurige parelmoervlinder

Melitaea didyma



De tweekleurige parelmoervlinder wordt gevonden in Zuid- en Midden-Europa, waar hij op veel plaatsen algemeen is. De dichtstbijzijnde populaties vliegen in het Duitse Rijn- dal, Baden-Württemberg en Noord-Frankrijk.

De waardplanten zijn vooral weegbree *Plantago* sp. en vlas- bekje *Linaria vulgaris*. De soort leeft in droge graslanden en ruigten. Hij vliegt aan de noordzijde van zijn verspreidings- gebied in één generatie tussen eind juni en eind augustus en overwintert als halfvolgroeide rups in rupsennesten. In Zuid-Europa vliegt hij in twee of drie generaties tussen midden april en september. Hij is vrij honkvast, maar toch tweemaal (in 1866 en 1986) in Groot-Brittannië gevonden.

(BINK 1992, TOLMAN & LEWINGTON 1999).

De tweekleurige parelmoervlinder is in totaal vijfmaal in Nederland waargenomen: Baarlo (LI, vrouwtje, juli 1935), Baarlo (LI, mannetje, augustus 1935), Havelte (DR, 28 juni 1958), Dorst (NB, 7 juni 1965) en Steenwijk (OV, 27 juli 1977). Een exemplaar bij Borculo (GE) in 2001 is zeer waar- schijnlijk meegekomen met plantmateriaal voor een tuin, wordt beschouwd als een adventief en is niet op de Neder- landse lijst opgenomen. Ook de waarneming van Dorst is (te) vroeg en ook deze vlinder is wellicht als rups meegenomen met plantmateriaal.

SUMMARY

Spotted Fritillary *Melitaea didyma*

Melitaea didyma is a vagrant. It has been seen five times, last in 1977. A butterfly that appeared in a garden in 2001 is not included in our data; presumably it was an adventive that had arrived here in French plant material.

Paarse parelmoervlinder

Boloria dia



De paarse parelmoervlinder, vroeger akkerparelmoervlinder geheten, komt in groot deel van Midden-Europa voor. De dichtstbijzijnde populaties vliegen in Wallonië. Uit zowel België als Duitsland wordt een achteruitgang gemeld en staat de soort op de Rode Lijst.

De waardplanten zijn verschillende soorten viooltjes, vooral één- of tweejarige soorten zoals het akkerviooltje *Viola arvensis* en het driekleurig viooltje *V. tricolor*. De soort komt in het noordelijk deel van het verspreidingsgebied voor op warme hellingen met open bos, struweel, bloemrijke of heischrale graslanden en bij luw liggende overhoekjes en braakliggende akkers. Hij vliegt in twee tot drie generaties van eind april tot begin september en overwintert als half- volgroeide rups. De soort is vrij zwerfvlugtig en zelfs enkele malen in Groot-Brittannië gevonden. (TAX 1989, BINK 1992).

De paarse parelmoervlinder is een zwerfer die in de afgelo- pen anderhalve eeuw vijftien maal is gezien. De voorlaatste melding is uit 1962, toen een exemplaar in juli nabij Groes- beek (GE) werd gezien. Op 20 augustus 1996 is het laatste exemplaar waargenomen en gefotografeerd in een graft tus- sen akkers op het landgoed Terworm bij Heerlen (LI). De overige waarnemingen zijn: Hoogeveen (DR, 1850-1860), Liesbos (bij Breda, NB, 25 juli 1866), Breda (1866), Breda (10 mei 1870, vrouwtje), Groningen (1860-1870), Drenthe (1860-1870), Arnhem (GE, 1874), Limburg (1 juni 1901), Limburg (2 juni 1902), Vorden (GE, augustus 1906, 2 vrouwtjes), Baarlo (LI, 6 augustus 1934, 2 mannetjes), Baarlo (juli 1935, mannetje), Wahlwiller (LI, 17 augustus 1941, vrouwtje). Daarnaast zijn er nog een aantal meldingen uit de ne- gentiende eeuw uit Groningen en Drenthe die echter ook betrekking kunnen hebben op de veenbesparelmoervlinder. Een aantal waarnemingen is in opvolgende jaren bij dezelf- de plaats gedaan - zoals bij Breda/Liesveld (NB, 1866, 2 plaatsen en 1870), en Baarlo (NB, 1934 en 1935) - zodat deze soort mogelijk een onregelmatige standvlinder is. Geruch- ten dat van deze soort een populatie bij Eijsden (LI) heeft gezeten, zijn nooit bevestigd. Wel is de soort recent nog op het Belgische deel van de Sint-Pietersberg waargenomen.

(GERAEDTS 1986, ADAMS & PRICK 1997, AKKERMANS ET AL. 2001).

SUMMARY

Weaver's Fritillary *Clossiana dia*

Clossiana dia is a vagrant. It has been sighted fifteen times, last in the province of Limburg on 20th August 1996.