

## Doodgereden bever in Zuid-Limburg in 1997

In het voorjaar van 1998 kwam er via Rijkswaterstaat een melding binnen dat er in mei 1997 in Zuid-Limburg een bever was doodgereden op de A2 bij Panheel. Waarschijnlijk gaat het hier om dezelfde bever die in april 1997 in de Maasplassen bij Roermond werd waargenomen (van Buggenum & Backbier, 1997). Deze plassen liggen vijf tot tien kilometer ten noordoosten van Panheel. Dit is sinds 1993 de derde bever die in de omgeving van Roermond werd doodgereden.

In het aangehaalde artikel werd terecht vermeld dat het hoogstwaarschijnlijk om nakomelingen gaat van bevers van een herintroductieproject in de Eifel. In de periode 1982/1988 werden in de Eifel echter geen zes, maar twaalf bevers uitgezet; negen zwarte en drie bruine. Acht bevers waren afkomstig van een beverfokkerij in Polen en vier bevers werden in Polen in het wild gevangen (pers. Med. D. Fink, Forstamt Hürtgenwald Eifel). In de beverfokkerij en de vrijlevende oostelijke Poolse beverpopulatie is ongeveer 70% van de bevers zwart. Van oorsprong gaat het bij de 'Poolse bevers' om een menging van bevers afkomstig uit Rusland en uit Wit-Rusland en Litouwen. Ze worden soms aangeduid als de ondersoort *Castor fiber vistulanus* (Zurowski, 1989). Door anderen worden de bevers uit deze gebieden als twee ondersoorten beschouwd: in Rusland *C.f. osteuropaeus* en in Wit-Rusland en Litouwen *C.f. belarusicus*. De bevers die langs de Midden-Elbe leven en waarvan een kleine honderd in Nederland werden uitgezet, worden tot de ondersoort *C.f. albicus* gerekend (Heidecke, 1986). Deze indeling is overigens gebaseerd op morfometrische gegevens en niet op genetisch onderzoek.

# WAARNEMINGEN

### Literatuur

- Buggenum, H.J.M. van & L.A.M. Backbier, 1997. Weer een bever gezien in Midden-Limburg. *Zoogdier* 8(2):32-33.  
Heidecke, D., 1986. Taxonomische Aspekte des Artenschutzes am Beispiel der Biber Eurasiens. *Hercynia* 22: 146-161.  
Zurowski, W., 1989. Wiederaufbau des Biberbestandes in Polen.

Vorteile und Gefahren der Zucht: 219-235. In: E. Schneider (red.). *Die Illusion der Arche Noach: Gefahren für die Artenhaltung durch Gefangenschaftszucht*. Echo-Verlag, Göttingen.

Vilmar Dijkstra, Dijkstraat 68, 6328 JS Arnhem, 026-4431826 (NL)

## Tweekleurige vleermuis ook in Dordrecht

Het Natuur-Wetenschappelijk Centrum van de Natuur- en Vogelwacht Dordrecht (NWC) doet sinds 1987 onderzoek naar de vleermuisstand op het Eiland van Dordrecht. In de zomer gebeurt dat met de bat-detector en 's-winters worden de winterslaapplaatsen bezocht. Ook worden meldingen van particulieren, die bij toeval in aanraking komen met vleermuizen, nagetrokken.

Tot eind 1997 zijn zes soorten

vleermuizen waargenomen. Vier van deze soorten, de gewone grootoovleermuis, de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de laatvlieger, bewonen het Eiland van Dordrecht het hele jaar door. Van de andere twee soorten, de watervleermuis en de meer-vleermuis, zijn slechts enkele waarnemingen in het najaar bekend. In januari 1998 werd tijdens een bezoek aan een winterslaapplaats een nieuwe

De tweekleurige van Dordrecht. Foto Henkjan Faber



soort ontdekt: de gewone baardvleermuis (Haan, 1997).

In november 1998 kwam bij het NWC een vleermuis binnen die op een zolder was gevonden in Dordrecht, in km 105-422. Bij het opmeten bleek het beestje aan één stuk door zeer kenmerkende sociale geluiden uit te stoten. Al snel was duidelijk dat het om een soort ging die nog nooit eerder op het Eiland van Dordrecht waargenomen was, namelijk de tweekleurige vleermuis *Vespertilio murinus*. De vleermuis was niet gewond en verkeerde in goede conditie, zodat hij na determinatie dezelfde dag nog kon worden vrijgelaten.

De tweekleurige vleermuis is een bewoner van vooral sple-

ten in gebouwen, zolders en rotsen. De woning waar deze soort nu gevonden werd is ongeveer vijftien jaar oud. Het eigenlijke woongedeelte is bovenop de garage gebouwd en de woning heeft een ruime zolder. In de wijk zijn veel oudere bomen, struiken en ander groen aanwezig. Ook is er in de nabijheid een waterpartij met beplanting eromheen. In de directe omgeving van de vindplaats bevinden zich enkele torenflats van 12-15 verdiepingen hoog.

Tot voor kort werd aangenomen dat de meldingen van tweekleurige vleermuizen alleen betrekking hadden op migrerende dieren vanuit Denemarken en Noord-Oost Europa.

Tweekleurige vleermuizen kunnen zeer grote afstanden afleggen. In 1998 werd echter de eerste zomerkolonie voor Nederland aangetroffen, in Maarssebroek (Jansen & van Noort, 1998). In Zuid-Holland waren alleen meldingen (exclusief dit exemplaar) bekend van tweekleurige vleermuizen uit de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

#### Literatuur

- Haan, A., 1997. Baardvleermuizen ontdekt in Dordrecht. *Zoogdier* 8(4):29.
- Jansen, E. & B. van Noort, 1998. Eerste kolonie tweekleurige vleermuis in Nederland ontdekt! *Zoogdier* 9(1):10-13.

Alexandra Haan, Scholierstraat 30,  
7415 SW Deventer, 0570-634394