



Waarnemingen

Bijzondere waarnemingen van zoogdieren in Vlaanderen en Nederland.



Hermelijn versus torenvalk

Hans de Vries

Een bijzondere ontmoeting op het eiland Marken: een torenvalkje dook op zo'n 50 meter afstand een boom in en ik zag nog iets anders bewegen in de donkere schaduwen in de boom. Ik dacht een andere torenvalk, wellicht een paartje! Toch maar maximaal ingezoomd en een plaatje geschoten. Ik kon het niet goed zien omdat het een zonovergoten dag was, tegen 12:00 uur (hard licht) en mijn vrouw en ik in de volle zon liepen.

Toen ik thuis kwam wachtte er een echte verrassing! Torenvalk ontmoet een boommarter? Omdat ik meende een boommarter te herkennen, heb ik Ben van den Horn (voorzitter Werkgroep Boommarter Nederland) hiervan op de hoogte gesteld en hem de betreffende bewerkte foto (verkleind naar 600 x 800) gestuurd. Ben meldde mij dat het geen boommarter, maar een hermelijn betreft.

Verkeerde spoor

De pootafdrukken in het artikel "Mollensporen in de Amsterdamse Waterleidingduinen" hebben de auteurs op het verkeerde spoor gezet. Het zijn niet de loopsporen van een mol, maar van een pad. Lange trajecten en elkaar kruisende paddensporen zijn geen zeldzaamheid in het duinzand, maar meestal alleen te vinden in vroege ochtenduren als er nog een dauwlaagje over het zand ligt. Niet helemaal zeker is of het hier een loopspoor van

een gewone pad (*Bufo bufo*) betreft of van een rugstreeppad (*Bufo calamita*). Beide zijn mogelijk, maar om meerdere redenen is de rugstreeppad hier het meest waarschijnlijk. Onder de padden is de rugstreeppad een echte 'loper', wat vaak resulteert in een vrij recht, doelgericht loopspoor zonder veel omwegen of plekken waar de soort rond gescharreld heeft. Ook het kruisen van meerdere trajecten wijst hierop. De vindplaats is bovendien een locatie waar de rugstreeppad algemeen voorkomt.

Annemarie van Diepenbeek,
sporendeskundige

