

Gegevens over het opvoeden van jonge Eekhoorns



Tekening: Marius Kolvoort.

Mevrouw *Anneke de Weert-Groenevelt* (Herfterlaan 6, 8024 PJ Zwolle) schrijft ons over de opvoeding van jonge Eekhoorns. Belangrijk is dat in het volgende recept pruimensap voorkomt en dat na de voeding het buikje gemasseerd moet worden. Verder is tocht funest, evenals té warm of té koud.

In Diergeneeskundig Memorandum' 22e jaargang - no.5 - bladzijde 339 vermeldt Ben Shaul (1962) het volgende recept:

Volle, ongepasteuriseerde melk 3 delen;
pruimensap 1 deel;
water 1 deel;

een klein beetje calcoiumgluconaat
om de andere dag wat geklutst ei
af en toe een druppel vitamine B complex.

Voer de dieren elke twee uur.

Bij het spenen in de 7e en 8e week gaat men geleidelijk over op haverhout, zachte (geweepte) zaden, sla, grapefruit, wortels, brood en later noten.

Te verwachten is dat ook met voeding van lichaamswarme koffiemelk goede resultaten te bereiken zijn.

Ontwikkeling na de geboorte

Het geboortegewicht is 8-12 gram. Het eerste nesthaar wordt tussen de 10e tot 13e dag zichtbaar. De ogen gaan open als de dieren 28 tot 32 dagen oud zijn. De bovenste snijtanden komen na ongeveer 35 dagen door. Na 40 dagen gebruiken ze het eerste vaste voedsel. Als de dieren 45 dagen oud zijn, verlaten ze het nest en tussen 55 en 60 dagen na de geboorte zijn ze zelfstandig. Vanaf dat moment moeten de dieren weer in de natuur worden teruggebracht. P.Zwart.

Uit Shaul, B.D.M. (1962): Notes on hand-rearing various species of mammals. Int. Zoo Yearbook 4:300-332.

Van *Saskia Kipp* (Thaerlaan 7, 3571 EA Utrecht) ontvingen wij een afschrift van de inhoud van het boekje 'Verzorging van ouderloze dieren' van C.E. Spaulding & Jackie Spaulding, een vertaling van het boek 'The Complete Care of Orphaned or Abandoned Baby Animals' dat in 1979 verscheen bij de Rodale Press, Emmaus, USA. De Nederlandse vertaling is van dr. J.C. van der Steen, de bewerking van G.J.J. Snelder en in 1981 uitgegeven door de Uitgeverij Bosch & Keuning N.V., Bremstraat 11, 3742 RD Baarn. Het boekje kost f 19,50.

Dit boekje schrijft het volgende over Eekhoorns (bladzijden 79-81):

Baby-Eekhoorns worden dikwijls uit het nest geworpen en soms gedood door het mannetje. Ze zijn gemakkelijk kunstmatig op te fokken en zeer geschikt als 'tijdelijke huisdieren'.

Als jonge Eekhoorns worden gevonden moeten ze eerst worden onderzocht op verwondingen en vlooien. Gebroken poten en bijtewonden komen vaak voor. Als een poot gebroken is, moet u met de Eekhoorn naar de dierenarts gaan om het te laten spalpen. Baby-Eekhoorns kunnen

goed worden gevoed met een poppenfles of een zuigflesje, die in alle dierenwinkels te koop zijn. Kijk echter eerst of er een zachte, rubber speen op zit.

De jongen worden kaal en blind geboren en zijn tamelijk hulpeloos. Na vier weken zijn de ogen open en zijn de jongen behaard. Heel jonge Eekhoorns, die nog naakt en blind zijn, kunnen heel moeilijk in leven worden gehouden, daar dan kleine en vele voedingen noodzakelijk zijn. Zijn ze eenmaal goed behaard dan zijn ze gemakkelijk op te fokken.

Voeding

Jonge Eekhoorns moeten worden gevoed met goed verteerbaar voedsel, zoals die welke voor baby's van de mens verkrijgbaar is (zonder ijzer) of met geitemelk (doe er geen roosvicée of vitaminen bij, dan treedt diarree op). Er moet iedere twee uur met de fles worden gevoed. Geef de baby's juist zoveel tot ze genoeg hebben, maar niet zoveel, dat ze overvoed zijn.

Zodra de Eekhoorns goed zijn behaard en de ogen open zijn, kunt u een beetje eiwitrijk, droog babymeel aan de melk toevoegen. Maak de vloeistof niet te dik, zodat deze de opening in de speen nog kan passeren.

Spoedig kunnen ze wat meel met melk van een lepeltje opnemen.

Als u zeer jonge baby's verzorgt moet u eraan denken, dat ze geprikkeld moeten worden om urine en faeces uit te scheiden.

Dit kan gebeuren door het achterlijf en het rectale gebied met een warme, vochtige doek te masseren. Doe dit na iedere voeding, zolang tot de jongen het uit zichzelf doen. Het is nodig hen op deze wijze te helpen anders krijgen ze verstopping of blijft de urine achter, wat vergiftiging veroorzaakt.

Jonge Eekhoorns leren spoeding aan wat voedsel te knagen. We geven de voorkeur aan crackers met pindakaas, broodkorsten, appels, bananen, ongezoeten pinda's en zonnebloempitten.

Wees voorzichtig met het in de hand nemen van de jongen, daar ze scherpe tanden hebben en u zullen bijten als u hen verschrikt.

Veilig vrijlaten

Jonge Eekhoorns kunnen vrij gemakkelijk worden vrijgelaten. Ze zijn spoedig in staat om voor zichzelf te zorgen en leren zich snel aan de natuur aan te passen, zelfs in een stad.

In het begin keren ze terug voor voedsel en voor gezelschap, maar spoedig komen ze nog alleen zo nu en dan om voedsel te halen. Daarna bijna niet meer daar ze zich volkomen tevreden voelen bij de andere wilde Eekhoorns.

Voedseltabel: van geboorte tot vrijlaten	van geboorte tot 4 weken	4—6 weken	6—8 weken	8 weken en daarna
melk	x	x	x	...
meel	...	x	x	...
brood	x	x
vruchten	x	x
zonnebloem- pitten, noten	x
voedingen per dag	12	9	9	vrije keuze

Vincent van Laar (Badelochstraat 12, 3813 DS Amersfoort) gaf ons twee literatuur-opgaven over het grootbrengen van jonge Eekhoorns in gevangenschap:

Liebermann, F. (1928) in Aus der Heimat 41 (12) - december 1928.

Gewalt, W. (1952): Beobachtungen über die Aufzucht von Eichhörnchen (*Sciurus vulgaris*) in der Gefangenschaft. D. Zoolog. Garten — NF 19 : 26-33.

Vermoedelijk zijn beide artikelen aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. 'Belangrijk kan ook zijn', schrijft Van Laar, : The UFAW Handbook of the Care and Management of Laboratory Animals, London (aanwezig in het Zoologisch Laboratorium, Universiteit, Amsterdam). Daarin worden ook veel 'inheemse' zoogdieren (waarschijnlijk ook de Eekhoorn) behandeld.

Redactie.

Een interessant en algemeen artikel over de Eekhoorn schreef Rob Bijlsma pas geleden in 'Argus' 7 (4) : 19-22 — 1982: 'Drukke eekhoorn: altijd eten, altijd bezig...'