

Het terugplaatsen van de Egels in de natuur

Wietske Voorhoeve

In mei worden de Egels, die de winter in een egelopvangcentrum doorgebracht hebben, weer in de natuur teruggezet. Hierop worden de Egels goed voorbereid.

In de tweede helft van maart dient er bij de Egels nog een mestonderzoek gedaan te worden om te controleren of de dieren nog parasiet-vrij zijn. Als er nog long-, maag- of darmhaartwormen in de mest aangetroffen worden, moeten de Egels hier nog tegen behandeld worden.

Het beste is, deze behandeling ongeveer een maand voor het uitzetten uit te voeren, in verband met eventuele bijwerkingen tijdens of vlak na de kuur.

Aangezien te dikke en zware Egels traag zijn en zich niet meer snel en goed kunnen ophalen, moeten Egels die meer dan 800 gram wegen de laatste maand een verminderd rantsoen hebben. De beste overlevingskansen hebben Egels die met een gewicht tussen de 600 en 800 gram uitgezet worden (dit geldt natuurlijk alleen voor de herfstjongen en niet

voor volwassen Egels, die veel zwaarder zijn).

Afhankelijk van het voorjaar kan vanaf half april met uitwennen begonnen worden. Dit jaar begon het voorjaar erg laat, zodat wij hier pas in mei mee konden beginnen.

Voor het uitwennen bestaan verschillende manieren. In ons egelopvangcentrum gaat dat als volgt:

De Egels worden steeds gedurende een week à tien dagen met twee tegelijk (mannetje en vrouwtje, aangezien twee mannetjes vreselijk





vechten) in één van de buitenvolières gezet. Deze volières zijn goed begroeid en er ligt veel hout en dor blad, zodat de Egels weer goed aan de natuurlijke schuil- en voedselmogelijkheden kunnen wennen.

De eerste dagen worden de Egels gewoon gevoerd, waarbij de nadruk op het voeren met meelwormen komt te liggen. Na een paar dagen wordt het rantsoen verminderd. Er is veel levend voer aanwezig en de Egels hebben intussen weer geleerd hoe ze dat kunnen vinden. Het voedselzoekinstinct is groot en meestal kijkt de Egel na een week niet meer naar zijn voerbakje om, maar zoekt hij zelf, luid snuivend, zijn kostje bij elkaar. Intussen heeft de Egel ook geleerd om zich goed te verstoppen. De eerste dag slapen ze vaak zomaar op de grond, maar na een paar dagen weten ze zich al goed tussen takken en blad te verstoppen en na een week zijn ze praktisch onvindbaar. Dan is het moment aangebroken om ze weer terug te zetten in de natuur. Gelet wordt hierbij op een terrein met goede schuil- en voedselmogelijkheden en ver van drukke verkeerswegen. Als het mogelijk is, wordt de Egel op de plek gezet waar hij vandaan kwam, als dit ten minste een geschikte plek is. De Egels worden paarsgewijs uitgezet.

Verder nog een aanvulling op mijn artikel over Egels in Huid & Haar van mei 1986. In maart 1986 zijn de egelasielhouders weer bij elkaar gekomen om de ervaringen met Egels van het afgelopen seizoen uit te wisselen. Met name met betrekking tot de bestrij-

ding van longwormen en long-, maag- en darmhaartwormen zijn er enkele nieuwe inzichten ontwikkeld.

Met het middel Ripercol waren bijzonder goede resultaten geboekt. Dit middel kan zowel onverdund als verdund met aquadest bij de Egel ingespoten worden. Bij de eerste methode moet een tot op 0,01 ml afleesbaar injectiespuitje gebruikt worden. Verder kan Ripercol ook over het voer worden gedruppeld. Van het middel Ivomec is bekend geworden, dat de marge tussen de dosering waarbij de parasieten gedood worden en die waarbij de Egel gedood wordt, erg nauw is. Hierdoor is de kans dat zwakke Egels de behandeling niet overleven, nogal groot. Bovendien worden door Ivomec niet alle inwendige parasieten gedood. De meeste egelasielhouders zijn intussen dan ook van het gebruik van dit middel afgestapt.

Telmin; van dit middel is gebleken, dat het vrij vaak een sterk verminderde eetlust tot gevolg heeft, hetgeen voor zwakke Egels tot de dood kan leiden.

Zoals ik in mijn vorige artikel meldde hebben wij in ons egelopvangcentrum bij de Egels veel gebruik gemaakt van multi-vitaminen. De multi-vitaminen kunnen zowel over het voedsel gedruppeld als bij de Egel ingespoten worden. Ook de bij Egels wel eens voorkomende verlamningsverschijnselen ten gevolge van eenzijdige voeding (bijvoorbeeld bij Egels die niets anders dan meelwormen willen eten), konden door een dagelijkse multi-vitamine-injectie genezen worden.