

Celithemis elisa est une des espèces qui ont été peu récoltées au Québec. Selon A. ROBERT (1963, Bull. Service Faune, Prov. Québ. 1: 223 pp.), E.M. WALKER & P.S. CORBET (1975, *The Odonata of Canada and Alaska*, Vol. 3, Toronto Univ. Press), R. HUTCHINSON (1977, *Cordulia* 3: 1-8) et R. HUTCHINSON & A. LAROCHELLE (1977, *Cordulia* [Suppl.] 3, 45 pp.) cette espèce habiterait surtout les rives marécageuses des rivières.

C'est en juin 1933 que cette espèce fut récoltée pour la première fois au Québec (E.M. WALKER, 1934, *Rep. Québ. Soc. Prot. Pl.* 26: 96-105). Elle fut capturée à Alcove (45° 11' lat N, 75° 56' long O), petit hameau de la municipalité La Pêche dans le Gatineau. Par la suite J. LEGAULT (1975, *Cordulia* 1: 121-123; — 1977, *loc. cit.* 3: 76-78) la capturait au lac Selby (45° 06' lat N, 72° 48' long O), au Mont Pinacle, HUTCHINSON (1977) ainsi que HUTCHINSON & LAROCHELLE (1977) mentionnent aussi Sainte-Béatrix (46° 12' lat N, 73° 37' long O) comme une autre station de cette espèce. J. POITRAS (1979, *Fabriques* 5: 6-8) fait état de la récolte de cette espèce à Saint-Néré (46° 44' lat N, 70° 43' long O). Finalement, B. MENARD (1987, *Fabriques* 13: 51-56) rapporte qu'il a capturé cette espèce à Gatineau et à Maniwaki.

Cette espèce fut capturée au cours de l'été 1983 à Blainville (45° 40' lat N, 73° 53' long O). A ce moment, nous échantionnions un lac marécageux. Un individu mâle fut capturé le 23 juin alors que la température était de 34° C sous un ciel sans nuage et par un vent de 15 km/heure. Un second spécimen mâle fut capturé le 10 août alors que la température se situait aux environs de 32° C par un temps ensoleillé et sans vent.

Il est intéressant de noter qu'avec la naissance de clubs d'amateurs bien encadrés, beaucoup d'espèces d'odonates du Québec qui se voyaient considérées comme rares semblent aujourd'hui devoir se classer parmi les espèces relativement peu nombreuses mais dont l'aire de répartition s'avère beaucoup plus étendue que ne le laissait prévoir la littérature scientifique d'avant 1975. Aujourd'hui, avec l'aide des odonatologistes amateurs, il est à prévoir que l'aire de répartition de cette espèce en vienne à occuper la plus grande partie de la zone tempérée froide du

CELITHEMIS ELISA (HAG.): NOUVELLE STATION POUR LE QUÉBEC, CANADA (ANISOPTERA: LIBELLULIDAE) — CELITHEMIS ELISA (HAG.): A NEW RECORD FROM QUEBEC, CANADA (ANISOPTERA: LIBELLULIDAE)

2 ♂ are recorded from Blainville, and the status of this sp. in Quebec is reviewed.

Québec.

J.-G. Pilon et D. Lagacé, Département
des Sciences biologiques, Université de
Montréal, C.P. 6128, Montréal, Québec, H3C
3J7, Canada.