

ENALLAGMA CYATHIGERUM (CHARP.)
IN MAROKKO: ERSTNACHWEIS FÜR
NORDAFRIKA (ZYGOPTERA: COENA-
GRIONIDAE). — *ENALLAGMA CY-*
ATHIGERUM (CHARP.) IN MOROCCO:
THE FIRST RECORD FROM NORTH
AFRICA (ZYGOPTERA: COENAGRIO-
NIDAE)

4 ♂, 2 ♀, collected with a series of *E. deserti*
(Sel.) by M.A. Lieftinck at Aaouan nr Imouzzèr,
alt. 1400 m (26/29-V-1968) and deposited in

the Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden, is brought on record. This appears to be the first record of this sp. from the African continent.

Die Ergebnisse der zweiten Marokkoreise, die M.A. Lieftinck im Mai/Juni 1968 unternahm, wurden im Gegensatz zu seiner ersten Reise (siehe M.A. LIEFTINCK, 1966, *Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg.* 42[35]: 1-63) nie publiziert. Die von ihm gesammelten Libellen befinden sich in der Kollektion des Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden, Niederlande. Bei einer Durchsicht des *Enallagma*-Materials fand ich dort eine kleine, mit "*Enallagma deserti* Sel." gekennzeichnete, teils getütete, teils genadelte Serie, die mit folgenden Etiketten versehen war: "1400 m, Dayet, Aaoua nr Imouzzèr, 26.-29.5.68, MAL". Neben den echten *E. deserti* konnte ich jedoch auch 4 ♂, 2 ♀ von *E. cyathigerum* in dieser Serie bestimmen. Ein genauer Strukturvergleich zwischen den beiden syntop vorkommenden Arten ergab keinerlei Hinweis auf intermediäre Formen (Bastarde). Beide Arten sind vielmehr strukturell deutlich voneinander getrennt. Dies widerspricht der Annahme einiger Autoren (z.B. H.J. DUMONT, 1977, *Bull. Anns Soc. r. belge Ent.* 113, p. 89), wonach strukturelle Unterschiede zwischen *E. cyathigerum* und *E. deserti* unbedeutend sein sollen.

Die weitverbreitete, circumboreale *E. cyathigerum* wurde vorher noch nicht auf dem afrikanischen Kontinent nachgewiesen.

H. Lohmann, Ziegelackerweg 1, D-7888 Rheinfelden, Bundesrepublik Deutschland.