




NIEUWE BOEKEN NEW BOOKS

W. Faber

Alle prijzen zijn zonder verzendkosten.

Prices without handling and postage.

A Conchological Iconography – The Tribe LYRIINI. A Revision of the Recent Species of the Genera *Lyria*, *Callipara*, *Harpulina*, *Enaeta* and *Lep-toscpha* by P. Bail & G.T. Poppe, 2004. A4, 91 text pages, 68 colour plates, loose leaf. Ed.: ConchBooks, Hackenheim, Germany. ISBN 3-925919-65-1 € 68



A new part to the well-known iconography of G.T. Poppe & K. Groh and the third part to the family Volutidae. After the introduction to this family and the genus *Armoria* in the previous parts (see Spirula 323: 129-130) this new part deals with a number of genera belonging to the subfamily Volutinae. The arrangement is the same as in the other parts. In each genus the species are described in alphabet-

ical order: synonyms, types, type locality, range, habitat, shell description, animal (if available), comparison and remarks. B/w photographs and distribution maps accompany the discussions. Two species and three subspecies are described as new to science. The text part ends with a selected bibliography and an alphabetical index.


As always the excellent colour plates illustrate the variability in colour and other shell characteristics. To start with you can use the determination tool on the plates 66-67 existing of a small photograph of each (sub)species. One plate shows half a dozen living volutes.

Een nieuw deel van de bekende iconografie van G.T. Poppe en K. Groh en het derde deel van de familie Volutidae. De vorige delen waren gewijd aan de inleiding tot deze familie en aan het genus *Armoria* (zie Spirula 323: 129-130); in dit deel wordt een aantal genera behandeld behorende tot de onderfamilie Volutinae. De opzet is gelijk aan die in de eerdere delen. Van elk genus worden in alfabetische volgorde de soorten beschreven: synoniemen, typen, typelocatie, verspreiding, habitat, schelpbeschrijving, dier (indien beschikbaar), vergelijking en opmerkingen. Zwart-wit foto's en verspreidingskaartjes begeleiden de

besprekingen. Twee soorten en drie ondersoorten worden als nieuw beschreven. Het tekstgedeelte sluit af met een geselecteerde literatuurlijst en een index.

Zoals steeds geven de uitstekende kleurplaten een beeld van de variabiliteit van kleur en andere kenmerken. Om te beginnen kunt u gebruik maken van de determinatiesleutel op de platen 66-67 die bestaat uit een verkleinde afbeelding van elke (onder)soort. Eén plaat laat een zestal levende voluten zien.

Catalog of dealers' prices for shells, marine, freshwater & land ("Rice's prices") by T. Rice, 2004. 21st edition. A4, 129 + 32 + 24 + 18 + 6 pp, not illustrated. Loose leaf. Ed.: Of Sea and Shore Publ., Port Gamble, WA, USA. No ISBN. US\$ 25.



After 20 editions this catalog requires hardly any comment. It exists of five sections. The first one (129 pp) gives the genera in alphabetical order with their species also in alphabetical order, and of each species the author, the year, the country and the price. You will find the Conidae, Cypraeidae, Muricidae and Volutidae in the other sections. In these sections the species are mentioned from different localities with different prices; it is also mentioned if a species is not offered during the last year. It is also available on CD.

*

Na 20 drukken behoeft deze catalogus nauwelijks nog toelichting. Hij bestaat uit vijf afdelingen. De eerste (129 blz.) geeft de genera in alfabetische volgorde met hun soorten eveneens in alfabetische volgorde, en van elke soort auteur, jaar, land en prijs. De Conidae, Cypraeidae, Muricidae en Volutidae zijn ondergebracht in de overige afdelingen. In deze afdelingen worden van elke soort verschillende vindplaatsen vermeld met vaak ook verschillende prijzen; indien een soort het afgelopen jaar niet is aangeboden wordt ook dit vermeld. Ook beschikbaar op CD.

Farbatlas Fossillen by M. Ulrichs, B. Ziegler et al., 2003. 13.5 x 19.5 cm, 288 pp, 339

colour photographs, 37 drawings. Ed.: Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, Germany. ISBN 3-8001-3578-7.



This book deals with the fossil genera of Central Europe in particular, but also with fossil genera from England, France, Italy and Sweden. Pages 54-151 are devoted to molluscs: 30 gastropods, 35 bivalves, 59 ammonites and 7 other cephalopod genera. For each genus the authors give the geographical and geological information and the size, accompanied by a colour photograph but without the name of the species. A bibliography and index complete this guide.

Dit boek behandelt in hoofdzaak de fossiele genera van Midden-Europa maar eveneens fossiele genera uit Engeland, Frankrijk, Italië en Zweden. De bladzijden 54-151 zijn gewijd aan de mol-lusken: 30 buikpotigen, 35 twee-kleppigen, 59 ammonieten en 7 andere koppotigen. Van ieder genus geven de auteurs de geografische en geologische gegevens en de grootte, elk vergezeld van een kleurenfoto maar zonder soortnaam. Een literatuuropgave en register sluiten deze gids af.

2003-2004 Annuario Malacologico Europeo / European Malacological Index / Annuaire Malacologique Européen / Europäisches Jahrbuch der Malakologie by T. Cossignani (ed.). 17 x 24 cm, pp. 224, many illustrations in colour and b/w. Ed.: Mostra Mondiale Malacologia, Cupra Marittima, Italy. No ISBN. € 20.

Every two years this index is issued. It gives information about the museums in Europe with a malacological collection, the malacological organisations and magazines, a photographic review of malacologists, special-




ists and people taking part in the most important malacological shows and exhibitions of Europe and an index of many people dealing with molluscs as a professional or amateur. The information is given in different languages. Of course some details have changed in the meantime. The next issue is planned to be issued in April 2005.

Iedere twee jaar verschijnt dit jaarboek. Het geeft informatie over de musea in Europa met een malacologische verzameling, de malacologische organisaties en tijdschriften, een fotoserie van malacologen, specialisten en mensen die deelnemen aan de belangrijkste schelpenbeurzen en tentoonstellingen in Europa. De informatie wordt in verschillende talen gegeven. Uiteraard zijn verschillende gegevens niet meer juist door veranderingen in de loop van de tijd. De volgende uitgave staat gepland voor april 2005.

The Early Pliocene Gastropoda (Mollusca) of Estepona, Southern Spain by B. Landau, R. Marquet & M. Grigis. Part 1: Vetigastropoda, 2003; Part 2: Orthogastropoda, Neotaeniolossia, 2004. Part 1: A4, 87 pp, b/w pls. 19, 2 text figs. Part 2: A4, pp. 108, b/w pls. 20, 5 text figs. Ed.: Palaeo Publishing

PALAEONTOS 3

THE EARLY PLIOCENE GASTROPODA (MOLLUSCA) OF ESTEPONA, SOUTHERN SPAIN
PART 1: VETIGASTROPODA
B. Landau, R. Marquet and M. Grigis



Palaeo Publishing and Library vzw 2004

and Library vzw, Belgium, Palaeontos 3 and 4, ISSN 1377-4654. € 35 (part 1) and € 52 (part 2).

In these two volumes the authors describe, discuss and figure 79 and 95 species respectively, belonging to 37 and 52 different genera, of which 6 and 8 taxa are new to science. They all are gastropods of the Early Pliocene deposits of Estepona, in province of Malaga, Spain, the most important European Early Pliocene assemblage outside Italy. Many of these species (45 and 46) are still living which gives extinction rates of 60% and 48%. For each species are given: the scientific name with synonyms and literature, dimensions and material, shell description, discussion and distribution. References and indexes close both parts.

PALAEONTOS 4

THE EARLY PLIOCENE GASTROPODA (MOLLUSCA) OF ESTEPONA, SOUTHERN SPAIN
PART 2: ORTHOGASTROPODA, NEOTAENIOGLOSSA
B. Landau, R. Marquet and M. Grigis




Palaeo Publishing and Library vzw 2004

In dit werk beschrijven, bespreken en illustreren de auteurs 79 en 95 soorten die behoren tot 37 en 52 verschillende genera en waarvan 6 en 8 taxa als nieuw worden beschreven. Alle zijn afkomstig uit de Vroeg-Pliocene afzettingen van Estepona, provincie Malaga, Spanje, de belangrijkste Europese vindplaats uit die periode buiten Italië. Vele soorten (45 en 46) leven ook nu nog, hetgeen leidt tot uitsterfingspercentages van 60 en 48. Van elke soort worden gegeven: de wetenschappelijke naam met synoniemen en literatuur, de afmetingen en het besproken materiaal, de schelpbeschrijving, een bespreking en de verspreiding. Literatuuropgaven en registers sluiten beide delen af.

Australia's Spectacular Cowries. A Review and Field Study of Two Endemic Genera: *Zoila* and *Umbilia* by B. Wilson & P. Clarkson. 21 x 30 cm, 396 pp, 400 colour and b/w plates, 22 distribution maps. Ed.:

Odyssey Publ., El Cajon, California, USA. ISBN 0-9661720-2-7. € 110.




All available information about the two Australian genera *Zoila* and *Umbilia* (10 species and 6 subspecies) can be found in this book. Shell descriptions and also descriptions of the living animals are given, both accompanied by many excellent colour photographs: shells with all their varieties in form and colour but also the living animals and the different sponges on which many of these cowries live. The authors give also extensive nomenclatural and historical notes, data about evolution, habitat, distribution (with maps), breeding and larval development. A bibliography, a glossary, two taxonomic indexes, one of the cowries and the other one of the sponges, complete this work.

Alle beschikbare informatie over de beide Australische genera *Zoila* en *Umbilia* (10 soorten en 6 ondersoorten) zijn in dit boek te vinden. Niet alleen beschrijvingen van de schelpen maar eveneens die van de levende dieren, beide vergezeld van vele uitstekende kleurenfoto's: schelpen met al hun variaties in vorm en kleur evenals de levende dieren en de sponzen waarop vele van deze kauries leven. De auteurs geven bovendien uitvoerige aantekeningen met betrekking tot de naamgeving en de geschiedenis, bijzonderheden over de evolutie, habitat, verspreiding (met kaarten), voortplanting en larvale ontwikkeling. Een literatuuropgave, een glossarium en twee registers, één voor de kauries en één voor de sponzen, sluiten dit werk af.

Tailandia. Holocene and Recent shallow soft-bottom mollusks from the northern

Gulf of Thailand area: Scaphopoda, Gastropoda, additions to Bivalvia by E. Robba, I.D. Geronimo, N. Chaimanee, M.P. Negri & R. Sanfilippo. A4, 287 pp, 37 b/w plates, Yearbook 2003, supplement to No. 309 of *La Conchiglia*. Ed.: Eulver, Roma, Italy. ISBN 88-86463-07-3..




This yearbook is bilingual: Italian and English. It is a continuation of an article by the same authors in *Bollettino Malacologico* (38(5-8): 49-132), titled: Holocene and recent shallow soft-bottom mollusks from the northern Gulf of Thailand area: Bivalvia. In this paper the authors describe scaphopods, gastropods and some newly found bivalves recovered from the Holocene Bangkok Clay in the Lower Central Plain of Bangkok along with those obtained from modern shallow bottoms in the Phetchaburi coastal area. It covers 336 species (4 scaphopods) of which 23 are proposed as new; 108 remain unidentified often because the authors have seen only one or two specimens. The shell of each species is described and illustrated in b/w; distribution, habitat and fossil records are also given. Apart from references this paper ends with a full list of all the discussed species with data about their place of origin: Holocene Bangkok Clay or modern environments (dead or alive).

Dit is een tweetalig jaarboek: Italiaans en Engels. Het is een vervolg op een artikel van dezelfde auteurs in *Bollettino Malacologico* (38(5-8): 49-132) onder dezelfde titel maar alleen over Bivalvia. In deze uitgave beschrijven de auteurs stootanden, buikpotigen en enkele later gevonden tweekleppigen die zijn verzameld in de Bangkok-Klei uit het Holoceen van het Lagere Centraal Plateau van Bangkok

samen met Recente exemplaren uit het ondiepe gedeelte van het kustgebied nabij Petchaburi. Het omvat 336 soorten (4 stootanden) waarvan 23 als nieuw; 108 blijven ongedetermineerd vaak omdat de auteurs slechts één of twee exemplaren onder ogen hebben gehad. De schelp van elke soort wordt beschreven en afgebeeld in zwart-wit; verder worden verspreiding, habitat en fossiele vondsten vermeld. Behalve een literatuuropgave kent het boek een volledige lijst van de besproken soorten met hun herkomst: Holocene Bangkok Klei of Recent (dood of levend).

Opisthobranchs of Bali and Indonesia by T. Tonozuka, 2003. 15 x 21 cm, 165 pp, over 500 colour photographs. Ed.: Hanhyo Communications Co. Publ., Tokyo, Japan. ISBN 4-484-03409-3.




In this book 205 different species of slugs of which nearly 40 are unidentified, are illustrated in excellent colour photographs. Varieties of several species and egg capsules are also pictured in colour. In an appendix there are pictures of some live cypraeids and ovulids and 21 flatworms because of their similarity to slugs. For each species the scientific name, the location, depth, length and distribution (if known) are given. The book closes with some references, web sites and an index to the scientific names. The text is in Japanese and English.

In dit boek worden 205 verschillende soorten naaktslakken, waarvan 40 ongedetermineerd, in fraaie kleurenfoto's afgebeeld. Ook variëteiten van verschillende soorten en eikapsels zijn in kleur weergegeven. In een hangsel zijn bovendien foto's opgenomen van enkele levende

kauries en Ovulidae alsmede van 21 platwormen wegens hun gelijkenis met naaktslakken. Van elke soort worden de wetenschappelijke naam, de vindplaats, diepte, lengte en – voor zover bekend – de verspreiding vermeld. Het boek sluit af met een korte opgave van boeken en websites en met een register van de wetenschappelijke namen. De tekst is in het Japans en het Engels.

I Cephalopodi delle Costa e dell'Arcipelago Toscano. Sistematica, Anatomia, Fisiologia e Sfruttamento delle Specie presenti nel Mediterraneo by D. Capua, 2004. 17 x 24.5 cm, 366 pp, over 200 colour photographs, over 100 b/w drawings. Ed.: Eulver, Roma, Italy. ISBN 88-8299-013-3. € 48.


The cephalopods, living in the sea between Toscana and Corsica, are discussed in this book which begins with some extensive chapters dealing with general subjects such as the paleontology and evolution, anatomy, physiology and fishery. Then follows the systematic part (pages 155-323) in which 45 species are discussed and illustrated. Apart from the description of each species and the name are also given the synonymy, distribution, ecology, habitat and local interest. Many drawings show details of the arms and the suckers. Text is in Italian only. A large bibliography and an index complete this book.



De koppotigen die leven in de zee tussen Toscane en Corsica worden in dit boek besproken. Het boek begint met enige uitgebreide hoofdstukken over algemene onderwerpen zoals de paleontologie en evolutie, anatomie, fysiologie en visserij. Daarna volgt het systematisch gedeelte

(bladzijden 155-323) waarin 45 soorten worden beschreven en afgebeeld. Behalve de naam en een beschrijving van elke soort worden ook synoniemen, verspreiding, ecologie, habitat en plaatselijk belang besproken. Vele tekeningen laten details van de armen en de zuignappen zien. De tekst is uitsluitend in het Italiaans. Het boek sluit af met een omvangrijke literatuuropgave en een naamregister.

Hawaiian Seashells by M. Stevens. 15.5 x 22 cm, 278 pp, nearly 500 colour photographs. Second edition, spiral bound. Ed.: Island Heritage Publ., Hawaii, USA. ISBN 1-89610-418-4.



2 chitons, 124 gastropods, 38 bivalves and 3 tusk shells are mentioned in this guide. Shell descriptions are not given, only the common and scientific names, the adult sizes, the depths and habitats. Each shell is pictured in colour: the gastropods ventrally and dorsally, for the bivalves the right and left valves (not the inside). Two indexes, one for the common names and one for the scientific names, and some references close this book.

2 keverslakken, 124 buikpotigen, 38 tweekleppigen en 3 stootanden worden in deze gids behandeld. Beschrijvingen van schelpen ontbreken, alleen de Engelse en wetenschappelijke namen, de grootte van volwassen exemplaren, de diepte en de habitat worden vermeld. Elke schelp is afgebeeld in kleur: van de buikpotigen zowel de monds als de rugzijde, van de tweekleppigen de rechter en de linker klep (niet de binnenzijde). Met twee registers, een voor de gewone en een voor de wetenschappelijke namen, alsmede enige literatuur wordt dit boek afgesloten.