


Thracia papyracea (Poli).
Een aanwinst voor de Nederlandsche fauna


door

A. W. LACOURT.

In navolging van de door verscheidene verzamelaars met veel succes beproefde methode van schelpgruis onderzoek heb ik het geluk gehad een voor ons land nieuwe Lamellibranchiaat te vinden. Het schelpgruis werd door mij iets ten zuiden van Katwijk aan Zee bij eb op 7 Maart 1936 verzameld. Daarin trof ik een enkele klep aan van een mollusk, die zoo op het eerste gezicht veel op *Mya truncata* L. leek. Bij nader onderzoek bleek het exemplaar echter niet overeen te komen met een jonge *Mya* daar de ventrale zijde meer gebogen is en de dorsale zijde vlak achter den top is ingedrukt, terwijl ook het slot geheel anders was. Na zoeken in het bekende werk van Jeffrey's meende ik dan ook te doen te hebben met *Thracia papyracea* (Poli), een determinatie die door den Heer van Regteren Altena bevestigd werd. Het exemplaar is onvolwassen, op de foto is het voorwerp gereproduceerd ongeveer drie maal vergroot. Het slot van de schelp heeft een van uit de top iets schuin verloopende spleet met verlengd indrukssel van het ligament, van hieruit loopt een zwakke rib naar het achterste spierindrukssel. De bocht der mantellijn komt overeen met die van het geslacht *Mya*. De oppervlakte van de schelp is iets glanzend en bij sterke vergrooting duidelijk fijn gekorrelt. Het voorwerp ziet er volkomen recent uit. Voor verdere bijzonderheden zij verwezen naar het boek van Jeffrey's, Vol. III, bladz. 36, Pl. II, fig. 2, waar ook het slot is afgebeeld. In Vol. V, Pl. 48, fig. 4 en 4a wordt door Jeffrey's nog een fraaie afbeelding gegeven. De soort was reeds uit ons land bekend geworden, doch nog nooit aan onze kust recent aangetroffen. Volgens Jeffrey's is zij in de laminaria-zone in Engeland vrij algemeen, ook aan de Fransche kust komt deze soort voor. Aan den Heer van Regteren Altena dank ik nog de volgende bijzonderheden: Tersch (1912) vermeldt *T. pap.* als *T. phaseolina* (Lam.) zeldzaam in ons middenplioceen en



Cardium edule L. var. *clodiensis* Renier.
Nat. grootte.
Westelijke helft van de Westerschelde.



Thracia papyracea (Poli).
 $\pm 3 \times$ vergroot.
Katwijk aan Zee, A. W. Lacourt.

aanwezig in het oudste bovenplioceen. Van der Sleen (1912) en Nordmann (1928) vonden deze soort in de Eemlagen, Steenhuis (1915) in het oud-alluvium onder het duingebied van Schoorl en Van Baren (1924) uit den bodem van Terschelling op 10.5 m. diepte van een boring bij het dorpje Hoorn; de twee laatste vondsten zijn uit het Holoceen en het lijkt den Heer Van Regteren Altena niet onmogelijk dat deze exemplaren uit de Eemlagen afkomstig zijn.

Summary.

In this article a new mollusc is treated for the fauna of the Netherlands. A single valve of *Thracia papyracea* (Poli) was found along the coast south of Katwijk aan Zee on 7 March 1936 in shell-sand. The specimen, although in a young state is quite recent with a shining surface; seen under a high power it appears to be distinctly granulated. Fossil remains are found in various strata, especially in the Eem beds.