

Boekbespreking

J. A. MARSH, 1964. Cone shells of the world. Illustrated by O. H. RIPPINGALE. Brisbane etc., The Jacaranda press. 166 pp., 22 kleurpl. Prijs U.S.A. \$ 14,—.

Er is beslist moed voor nodig om een monografie te schrijven over een grote en ingewikkelde familie als de Conidae, en in de 20e eeuw was er tot nu toe geen malacoloog die zich aan een revisie van de kegelslakken waagde. De schrijver is een verzamelaar van *Conus*-schelpen, en zijn verzameling heeft gediend als basis voor zijn boek. Een aantal hem ontbrekende soorten werd afgebeeld naar voorwerpen uit de collectie van het Brits Museum.

De titel belooft meer dan de inhoud geeft, want niet alle soorten zijn besproken. Van de recente Conidae, waarvan er ongeveer vijfhonderd bekend zijn, worden er 450 genoemd. Alle soorten worden geacht te behoren tot het genus *Conus*, hetgeen minder juist, maar voor praktisch gebruik wel handig is. De soorten worden ondergebracht in subgenera, hetgeen te prijzen is. Synoniemen van soorten worden niet genoemd, en dat is jammer, want in de Conidae zijn er heel wat. Het is niet juist dat variëteiten en vormen als soorten worden behandeld, al zegt de schrijver er wel bij dat het een variëteit of vorm van een andere soort is.

De beschrijvingen zijn summier, soms ontbreken zij geheel. Van vele soorten wordt vermeld waar zij oorspronkelijk zijn beschreven, de originele type localiteit is genoemd, ook al is die onjuist of onduidelijk (b.v. "Curacas" bij *Conus citrinus*, is dat Caracas of Curaçao?). De lengte van de schelp alsmede de verspreiding van de soort zijn genoemd. De kleur van het periostracum wordt, indien bekend, steeds vermeld, maar in de meeste gevallen moet de schrijver bekennen dat hij het periostracum niet gezien heeft.

Alle besproken soorten zijn in kleur afgebeeld, totaal 457 figuren op 22 platen, naar waterverftekeningen. Het nadeel hiervan is dat elke kleur in dezelfde tint is weergegeven, een tweede bezwaar is dat de figuren te vlak lijken. De afbeeldingen zijn derhalve minder van kwaliteit dan die van de *Conus*-monografieën uit de 19e eeuw.

Het boek besluit met een index en een beknopte bibliografie die chronologisch is opgesteld, maar niet altijd consequent.

Voor de verzamelaar heeft het boek toch zijn nut, want niet voor iedereen staan de plaatwerken uit de vorige eeuw ter beschikking, en wie reeds iets van *Conus*-soorten weet, zal er toch zijn onbekende soorten mee kunnen determineren. Met de moderne ongeïllustreerde naamlijsten van de Conidae (TOMLIN, 1937; ABBOTT, 1964), die ook de synoniemen vermelden, naast het werk van MARSH en RIPPINGALE, kan de verzamelaar zijn collectie reviseren.

Er is een appendix met opmerkingen van Dr. A. H. KOHN, een *Conus*-specialist, waardoor een aantal onjuistheden zijn achterhaald, al zijn er nog genoeg blijven steken. Hiervan noemen wij: Bogor is niet op Sumatra, maar op Java (p. 16), *Conus citrinus* leeft ook buiten Cuba (p. 50), *Conus aurantius* leeft niet in Oost-Indië maar in West-Indië (p. 53), *C. ranunculus* komt ook voor bij West-Afrika (p. 53), *C. bermudensis* wordt ook buiten Bermuda aangetroffen (p. 58), de verspreiding van *C. pygmaeus* (zuidelijke Caribische Zee) verschilt van *C. jaspideus* (West-Indië) (p. 62), *C. victor* leeft bij de Kleine Soenda Eilanden (p. 134), *C. dominicanus* is niet een vorm van *regius* (p. 153).

H. E. COOMANS