

**Buccinum undatum L. var. multiflexuosa nov. var.**

A.W. LACOURT

p/a Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden

Een groot exemplaar van *Buccinum undatum* L. van de Nederlandse kust is niet met één van de reeds bekende variëteiten te identificeren en wordt hier als nieuw beschreven.

*Buccinum undatum* L.  
var. *multiflexuosa* nov. var.

Schelp met dikke wand en lage winding, 97 x 57 mm, met normale spiraalsculptuur en voorzien van talrijke bochtige lengteribben ten getale van 20. Noordwijk, holotype in collectie van de auteur, no. IV D 910, fig. 1 (t.z.t. te plaatsen in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie).

De nieuwe variëteit lijkt op de var. *flexuosa* Jeffreys doch heeft veel meer, nl. 20, lengteribben op de laatste omgang tegenover de ca. 12 bij de var. *flexuosa*. De lengteribben zijn smaller, evenals de tussenruimten. De schelp is aangetast door een borend organisme, waarschijnlijk een worm (*Polydora* spec.?).

LITTERATUUR

JEFFREYS, J.G., 1867. British conchology or an account of the Mollusca which now inhabit the British Isles with the surrounding seas 4: 1-486. Londen.

SUMMARY

A new variety of *Buccinum undatum* L. has been described from a shell from Noordwijk as *multiflexuosa* nov. var. This variety is characterized by longitudinal ribs similar to those of the var. *flexuosa* Jeffreys, but more numerous, viz., 20 instead of about 12 on the last whorl. Holotype 97 x 57 mm.



Fig. 1. *Buccinum undatum* L. var. *multiflexuosa* nov. var., holotype, 97 x 57 mm.