

Lepidochitona cinerea in de Grevelingen
Revisie van de Nederlandse recente Polyplacophora: addenda

H. L. STRACK

Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Postbus 27020, 3003 LA Rotterdam

In mijn vorig artikel (Strack, 1982) is bij het onderschrift van fig. 6 op p. 73 een nadere verklaring over het voorkomen van *Lepidochitona cinerea* (L., 1767) weggefallen.

Op de kaart worden alle vindplaatsen van deze soort in de Grevelingen ten onrechte als verloren gegaan beschouwd (aangegeven met driehoekjes). *L. cinerea* leek namelijk in 1975 uit de Grevelingen verdwenen te zijn.

Deze keverslak is echter vanaf 1977 weer in kleine aantallen teruggevonden, o.a. bij Ouddorp (eigen waarneming, 25.IV.1982) en ten noordoosten van de Veermansplaat. De soort lijkt op het ogenblik zelfs in aantal toe te nemen (mondelijke mededeling R. H. D. Lambeck, Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek, Yerseke). Waarschijnlijk heeft de in 1978 in de Brouwersdam gebouwde in- en uitlaatsluis een gunstige rol gespeeld bij de herkolonisatie van *L. cinerea*, want door het inlaten van Noordzeewater steeg het zoutgehalte van de Grevelingen in niet onaanzienlijke mate.

LITERATUUR

STRACK, H. L., 1982. Revisie van de Nederlandse Polyplacophora. - Basteria 46: 69-76.