

**Neptunea (Neptunea) despecta despecta (L., 1758)
(Prosobranchia, Buccinidae) in Nederland**

Th. W. DE BOER

Mounewei 41, 9063 JL Molenend

&

J. DE LIGHT

Gladiolenlaan 4, 1731 XV Winkel

Op 14.IV.1984 vond de eerste auteur aan de vloedlijn bij paal 9 op Schiermonnikoog een exemplaar van *Neptunea (Neptunea) despecta despecta* (Linné, 1758). De schelp is blauwgrijs en door rekristallisatie ondoorschijnend. De hoogte bedraagt 92 mm en de breedte 42 mm.

Op 9.VI.1983 werd door de kotter HD 7 op 53°40'N 6°15'O in de Noordzee een eveneens oude, blauwgrijze schelp van deze soort opgevist; deze bevindt zich in de collectie van de tweede auteur. Hoogte 126 mm; breedte 73 mm.

Aangezien *N. d. despecta* niet wordt genoemd door Janssen (1975) meenden wij met een nieuwe soort voor ons land te maken te hebben. Nader onderzoek bracht echter aan het licht dat de soort reeds eerder in ons land was waargenomen en wel op Terschelling, tussen 1965 en 1974 (6 ex., deels fragmentarisch; G. Doeksen leg.) en op Schiermonnikoog, juni 1972 (1 ex., W.J. Taekema leg.). Alle exemplaren zien er oud uit. Mogelijk gaat het hier om fossielen. Voor figuren verwijzen wij naar Lindner (1977: 177) en Strauch (1972: 193).

Wij danken de heer A.W. Janssen voor determinaties en gegevens en de heren G. Doeksen en W.J. Taekema voor inzage in hun collecties.

LITERATUUR

- JANSSEN, A.W., 1975. Systematische lijst van Nederlandse recente en fossiele mollusken. — Meded. Werkgr. Tert. Kwart. Geol. 12: 115-170.
LINDNER, G., 1977. Elseviere's gids van de zeeschelpen: 1-256. Amsterdam-Brussel.
STRAUCH, F., 1972. Phylogeneese, Adaptation und Migration einiger nordischer mariner Mollusken-genera. — Abh. Senckenb. Naturforsch. Ges. 531: 1-211.

SUMMARY

Neptunea despecta in The Netherlands

In 1983 and 1984 old (fossil?) shells of *Neptunea despecta despecta* (Linné, 1758) were found in the northern coastal area of The Netherlands. Investigations made clear that between 1965 and 1974 at least 7 shells were found in The Netherlands.