

**Die Gattung Argna Cossmann, 1889 (Pulmonata: Pupillacea) in Spanien****E. GITTENBERGER**

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Postbus 9517, NL 2300 RA Leiden

*Argna biplicata* (Michaud, 1831) gilt als eine Art mit grossem, teilweise zersplittertem Verbreitungsgebiet. Es können drei Unterarten unterschieden werden: (1) *A. b. biplicata* aus dem Südosten Frankreichs und von da weiter südöstlich bzw. südlich in Italien bis zur Provinz Pescara, (2) *A. b. excessiva* (Gredler, 1856) aus Norditalien, vom Etschtal ostwärts, und im anschliessenden Süden Oesterreichs, und (3) *A. b. ulterior* Klemm, 1962, aus dem Epirus, Griechenland. In der Sammlung Klemm (Nr. 51689), im Naturhistorischen Museum in Wien, wurde ein Gehäuse von *A. biplicata* vorgefunden, welches von H. Franz 15.IV.1959 in Spanien, in der Provinz Valencia, südlich von Játiva, gesammelt wurde (Fig. 1). Es stimmt in der Mündungsbewehrung mit der Nominatrasse überein. Sonst ist es verhältnismässig breit; die Masse sind  $4,4 \times 1,8$  mm, bei nur sieben Umgängen.

Der Fundort dieses Gehäuses befindet sich etwa 800 km südöstlich vom bekannten Areal von *A. biplicata* bzw. deren Nominatrasse. Die Gattung *Argna* ist bisher überhaupt von der Iberischen Halbinsel noch nicht gemeldet worden.

*A. biplicata* lebt bekanntlich tief versteckt zwischen Humus und Geröll und kann daher leicht übersehen werden.

Herrn Dr. O.E. Paget (Wien) danke ich herzlichst für die Hilfsbereitschaft bei meiner Arbeit im Naturhistorischen Museum in Wien.




Fig. 1. *Argna biplicata* cf. *biplicata* (Michaud), Spanien, Valencia, südl. Játiva; H. Franz leg., 15.IV.1959.