

Verslag van het Congres te Leiden op 20 en 21 Juli 1935.

Op Zaterdag 20 Juli werden om twee uur de deelnemers door het bestuur in Hotel Du Commerce ontvangen, waarbij een thee werd aangeboden. Hier hadden de deelnemers gelegenheid met elkaar en met het bestuur kennis te maken.

Om half drie vertrok het gezelschap per autobus naar de Broekpolder nabij Leiden ter bestudeering van de zoetwatermollusken. Hierbij werden o.a. gevonden Planorbis corneus, carinatus, vortex; Bi-

thynia tentaculata, leachi; Lithoglyphus naticoides (levend); veel Sphaerium corneum; Unio pictorum, tumidus; Anodonta zellensis, piscinalis. De vondsten waren voor velen een gelegenheid om met vormen, die zij nog niet gezien hadden kennis te maken. Op een moerassig weiland werden verder nog Zonitoides nitidus in prachtige exemplaren; Hygromia hispida en Vertigo antivertigo verzameld. Ondanks de herhaalde hevige regenbuien bleef de stemming uitstekend, zoodat alle deelnemers welvoldaan naar Hotel Du Commerce terugreden. Hier volgde een gezellige maaltijd.

Om 8 uur had in Du Commerce de jaarvergadering plaats. Na een welkomstwoord van den voorzitter werden de jaarverslagen van secretaris en penningmeester gelezen. Naar aanleiding hiervan vroegen de Heeren Branthorst en Blöte of het mogelijk zou zijn om in de toekomst een tijdschrift uit te geven. Hierop werd geantwoord, dat het bestuur dit zou overwegen en plannen zou maken; deze plannen zijn in dit nummer uitgewerkt. Enkele leden vroegen om literatuurlijsten; verder bleek, dat de boekbesprekingen geapprecieerd worden. Ook zullen tijdschriftartikelen in Nederlandsche bladen gerefereerd worden. Het stichten van een bibliotheek, waarmee reeds een begin gemaakt is, stuit af op de finantiën. Op de vraag of de vereeniging wetenschappelijk zal zijn of een amateursvereeniging, antwoordt de voorzitter, dat de vereeniging een wetenschappelijke vereeniging zal zijn, doch dat zij aan de amateurs zooveel mogelijk hulp moet bieden bij hun studie der molusken. Hierna is er gelegenheid voor de leden voor mededeelingen en vragen.

Mej. v. Benthem Jutting geeft een overzicht van onze inlandsche Anomia-soorten volgens de nieuwste inzichten. De Anomia-soorten (Paardenzadels) worden aangetroffen op stukken kurk, hout en op steenen. De soorten, die vroeger vaak verkeerd gedetermineerd werden en tot ephippium gebracht werden, worden gescheiden op de vorm en het aantal der spierindrucksels. De mededeeling werd toegelicht met materiaal en teekeningen.

Daarna toonde Dr. Henrard exemplaren van Barnea parva, welke soort reeds in het vorige nummer van het Correspondentieblad als inlandsch vermeld is.

De Heer De Koning vertelde dat Physa acuta, welke vroeger in de omgeving van Leiden slechts in de vijver van de Hortus te Leiden voorkwam, thans in de geheele omtrek van Leiden te vinden is, plaatselijk zelfs algemeener dan Physa fontinalis. Dit is Dr. Henrard ook opgevallen. Hij kreeg verder uit Rijswijk eenige exemplaren van een Amerikaansche soort n.l. Physa heterostropha. Deze soort is niet gemakkelijk van acuta te onderscheiden, zoodat we met de verspreiding van de soort voorzichtig moeten zijn.

De Heer v.d. Maaden vertelde dat hij Planorbis glabra bij 's-Hertogenbosch gevonden heeft. Verder brengt hij het probleem van de gapende exemplaren van Mactra corallina var. atlantica ter tafel. Reeds

verschillende malen is getracht hiervan een verklaring te geven, waarvan hij voorbeelden geeft. Deze verklaringen voldoen echter niet steeds.

Dr. Koumans vertelde naar aanleiding van een bezoek aan het Biologisch Station te Plymouth, dat Dr. Moore meent dat het voedsel van Purpura de kleur van de schelp zou bepalen. Verder houdt Dr. Moore zich bezig met een onderzoek over de groeisnelheid van Purpura en Littorina littorea.

De Heer v. Regteren Altena liet enkele zeldzame vondsten rondgaan. Planorbis riparius, die in 1921 in Utrecht door C. Druyvestein gevonden is, Vitrea contracta door J. Schoute in Zuid Limburg, later ook te Bloemendaal verzameld. Hij noemt de verschillen met V. crystallina waarbij ook de plaats van voorkomen (kalkrijkdom en vochtigheid van den bodem) vermeld wordt. Dr. Henrard noemt enkele voorbeelden van andere soorten, die door de kalkrijkdom van den bodem in Zuid Limburg en in de duinstreek gevonden zijn, n.l. Isthmia minutissima en Hyalinia nitens.

De Heer Brandhorst heeft op het eiland Wight een oligoceene kleilaag gevonden, die rijk aan fossielen is. Het zou van belang zijn na te gaan, welke soorten daar voorkomen.

Tenslotte demonstreerde de Heer Lacourt enkele zeldzame soorten, welke hij in schelvischmagen gevonden heeft: Trophon muricatus, Defrancia purpurea, Cylichna cylindracea, Dentalium entalis, Philine catena en verder enkele zeldzame soorten van onze kust.

Na de sluiting van de zeer geanimeerde vergadering wordt nog lang nagepraat.

Op Zondag 21 Juli werd een excursie gehouden per autobus naar Noordwijkerhout. Hier werden in de duinen verschillende soorten verzameld o.a. Cochlicopa lubrica, Pupilla muscorum, Vallonia costata en Succinea oblonga. Vervolgens werd langs het strand gewandeld naar Zandvoort. Op deze wandeling werden aardige vondsten gedaan o.a. verscheidene Phytia myosotis, Rissoa membranacea, veel Hydrobia ulvae, gave Lutraria elliptica enz. De Heer Van Regteren Altena vond eenige kurken, waarop hij o.a. Sphenia binghami aantrof. Van deze vondsten volgt van hem een kort verslag in dit nummer.

In Zandvoort werd de excursie en het congres gesloten met een kopje thee in het restaurant van het Zuiderbad.