

Vermeldenswaardige vondsten door H. van der Maaden.

Op 20 Augustus 1936 deed ik te Oss in Noord-Brabant een mooie ontdekking. Langs een achterweggetje, zeer dicht begroeid met braamstruiken, brandnetels en elzestruiken, vond ik Cepaea hortensis (Müller) bij tientallen. Het eigenaardige was het totaal ontbreken van een gebandeerd huisje in deze populatie. De verzamelde exemplaren konden gescheiden worden in typische slakkenhuisjes met geheel witten mond en andere, waarbij de lip een peristoom vertoont, dat gekleurd is en waar deze donkere kleur ook overgaat in een donker gepigmenteerd navelveld. Deze laatste behoren dus tot de var. fuscolabris Kreglinger. De kleurvarië-

teiten konden in drie scherp gescheiden vormen verdeeld worden, en wel:

1. de var. lutea Picard: helder geel met witten mondrand
2. de var. incarnata Picard: rose-rood met witten mondrand
3. de var. filholia Moq. Tandon: donker roodbruin-olijfkleurig met witten mondrand, met witten lip en ongepigmenteerd navelveld.

De variëteiten incarnata en filholia kwamen ook voor onder de var. fuscolabris, deze vertoonden een witten mondrand met een gepigmenteerd peristoom, het pigment over het navelveld verspreid.

De donkerbruin-olijfkleurige variëteit was nog niet in Nederland aangetroffen. De belangrijkste vondst deed ik juist aan het eind van mijn verzameltocht, toen ik van deze var. filholia een volkomen gaaf en uitgegroeid linksgewonden exemplaar in handen kreeg. Deze monstr. sinistrorsa Férussac was nog niet in ons land gevonden, doch is bekend uit Engeland, Frankrijk, Zwitserland en Noord Amerika.