

Vermeldenswaardige vondsten.

Lymnaea glabra (O.F. Mull.) Op 12 Augustus 1937 werd deze weinig voorkomende slak gevonden bij Oss (N.Br.), waar zeer veel exemplaren aangetroffen werden in een drooggelopen duiker. Coll. H. v.d. Maaden.

(Het bestuur dringt er bij de leden op aan, dergelijke kleine berichten niet achter te houden, maar in deze rubriek te laten vermelden. Bezitters van interessante vondsten, denkt er aan, de andere leden wachten erop!)

Arca lactea L. Hoewel herhaalde malen in losse kleppen langs onze stranden gevonden, was het twijfelachtig of deze soort wel tot onze fauna behoort. Interessant is het daarom te vermelden, dat op 24 Maart 1937, door A.J.D. Meeuse en J.B. Henrard bij Scheveningen, zuidzijde (stille strand) een doosje van deze soort is verzameld. Beide kleppen zijn nog door het ligament aan elkaar verbonden, dierresten ontbraken. (J.B. Henrard)

Sedert door mij in Basteria een en ander is medegedeeld geworden over de beide aan onze stranden aangetroffen soorten van Dosinia, heb ik van verschillende leden fraai materiaal, vooral doosjes, van deze soorten ontvangen. Alle voorwerpen bevestigen de destijds opgegeven soortverschillen. Beide soorten zijn in de Noordzee niet zeldzaam. Zoo verzamelde de heer A.W. Lacourt, doosjes van D. lincta op 60 mijl N.N.W. van IJmuiden, in Juli 1936, terwijl doosjes van D. exoleta door schipper van den Oever werden verzameld bezuiden de Tesselsche steenen bij de Haaks op 9 April 1937. Dergelijke vindplaatsen worden echter niet aangenomen voor de begrenzing van ons faunagebied.

Van den heer H. Kraai op Tessel ontving ik een kleine, maar zeer interessante verzameling mollusken, welke door schipper Willem Drijver op 18 vaam diepte bij „Terschellingerbank, richting Vlie“, opgevischt waren. Aldaar kwamen voor doosjes van Dosinia exoleta, D. lincta en Gari feroensis met levende dieren, de laatste voorzien van het periostracum. Een van de exemplaren van Gari was zeer groot en boven de maat (4.8 cm.). Daar deze vondsten binnen ons faunagebied vallen kunnen we deze 3 soorten thans definitief voor onze fauna vermelden. Onder het materiaal van schipper Drijver bevonden zich ook ledige huisjes van Nassarius reticulatus var. mammillatus (Risso). (J.B. Henrard)

In drijfhout, dat ik op 16 September 1937 te Katwijk aantrof, vond ik Teredo-materiaal, dat, gezien de paletten, onder Teredo navalis L. kon worden gerangschikt, hoewel deze paletten niet geheel typisch waren. De schelpjes zelf weken echter zeer af. Dr. Roch te Rovigno bracht dit materiaal tenslotte onder bij zijn forma borealis, welke hij gepubliceerd heeft in het Arkiv för Zoologi Band 22a Nr. 13 fig. 12 en 13 (1931)

Bij de bewerking van Teredo-materiaal uit de Scandinavische musea viel hem deze vorm herhaaldelijk op. Het zou een specifiek noordelijke vorm van *Teredo navalis* zijn, die toen in Denemarken en Duitschland nog niet gevonden was.

De kenmerken tegenover de forma typica zijn:

de uitholling der paletten is zeer diep; het oor is sterk gereduceerd, het voorstuk is vergroot, zoodat de schelp een iets ovalen omtrek krijgt; het lichaam van *f. borealis* is bruin getint en doorzichtig, terwijl dat van *f. typica* wit van kleur en minder doorzichtig is.

Door J.B. Henrard is deze *f. borealis* in drijfhout reeds in October 1928 bij Noordwijk aan Zee gevonden. Beide vormen bevonden zich aldaar in levenden toestand in hetzelfde stuk hout. (A.W. Lacourt).

Op Fransche oesters, die in het voorjaar van 1937 op de Iersche Bank zijn gebracht, zijn half October 1937 vier levende exemplaren van *Gibbula cineraria* L. gevonden door den heer A. Slabber, waarvan één wordt bewaard in het Museum te Middelburg. Ze waren alle vier bijzonder laag van winding.

In den zomer van 1937 is één exemplaar van *Gibbula magus* L. dood op de Iersche Bank aangetroffen. Het bevond zich op een perceel met Fransche oesters en is in ieder geval recent. Het bevindt zich evenals de 3 exemplaren *Gibbula cineraria* L. in de collectie Slabber. (C. Brakman).