

De strandexcursie naar IJmuiden op 3 April 1949

Het stortregende toen de excursisten zich om 10 uur op het station te Beverwijk verzamelden en even later de bus in de richting van Wijk aan Zee namen. Enkele kilometers voor het dorpje stapte het gezelschap uit. Te voet ging het naar de Gaasterbosjes een binnenduinterrein dat ten dele door naaldhout, ten dele door eikenbosjes begroeid is. Hier werden landmollusken gezocht. De rand van het coniferenterrein leverde slechts enkele soorten op; in mos op losse duingrond werden er in gering aantal Pupilla muscorum, Vitrina pellucida en Vallonia excentrica verzameld.

Rijker aan soorten waren de eikenbosjes, waar aangetroffen werden: Cochlicopa lubrica, Vallonia excentrica, V. costata, Vertigo pusilla, Pupilla muscorum (met en zonder parietale tand), Succinea oblonga, Limax maximus, Agriolimax reticulatus, Vitrina pellucida, Hyalinia nitidula, Retinella hammonis, Punctum pygmaeum, Fruticicola hispida, Arianta arborum en Cepaea nemoralis.

Op enkele punten werden met de zeef monsters genomen van de bladerbedekking onder struiken en bomen. De kleinste hierboven genoemde soorten werden voornamelijk op deze wijze verzameld.

Opmerkelijk was het ontbreken van elders in duinbossen algemeen voorkomende soorten als Carychium minimum, Columella edentula, Acanthinula aculeata, Vertigo angustior, Gonyodiscus rotundatus e.a., waardoor de molluskenfauna van de Gaasterbosjes een soortenarme indruk maakt. (Men vergelijk het resultaat met bijv. dat van de excursie naar de Waterleidingduinen, 4.10. '42, Corr. bl. no. 20, blz. 118). Op een rijtje vermolmende boomstammen werd nog vergeefs naar Balea gezocht.

Zonder veel oponthoud werd nu langs de Bosweg door de buitenduinen naar het strand gewandeld. Even voorbij de zijweg naar de Hoogovens werd aan weerszijden van de weg op de droge duinhelling een aantal levende, mooie volwassen exemplaren van de in ons land niet zeer algemene Helicella caperata aangetroffen, in gezelschap van Helicella ericetorum en Cepaea nemoralis.

Tegen een uur of een werd het strand bereikt. Het tijdstip was gunstig, want volgens de getijdentabel was het om 14.23 uur laag water. Bovendien was er enkele dagen tevoren een springtij geweest (27 Maart), wat de kans op interessante vondsten vergrootte. Het doel van de tocht was de Noorderpier van IJmuiden, die bij laag water onderzocht zou worden. Al verzamelend werden de vijf kilometers afgelegd. Er stond een straffe Zuidwestenwind die veel zand opjog en het verzamelen moeilijk maakte. Verscheidene beperkten zich dan ook tot het nemen van monsters schelpgruis om deze thuis uit te zoeken.

Op de Noorderpier werden geen belangwekkende vondsten van mollusken gedaan. Er is ijverig gezocht naar de in ons land zeer zeldzame Littorina neritoides petraea, die vroeger op een der pieren van de Scheveningse haven is aangetroffen. Echter zonder succes.

Het thuis uitgezochte schelpgruis leverde de volgende soorten op (Achter de namen van soorten die volgens de binnengekomen analyses slechts door een of enkele excursisten verzameld werden, zijn tussen haakjes de namen van laatstgenoemden vermeld):

Littorina saxatilis saxatilis (leg. v. Hooven), L. saxatilis rudis, L. littorea, Hydrobia ulvae, Cingula semicostata aculeus (leg. v. Hooven; v. Zijp), Alvania crassa (leg. v. Hooven, det. v. R. Altena), Rissoa membranacea (leg. v. Bruggen), Tornus subcarinatus (leg. v. Hooven), Turritella communis (leg. Kuiper, in coll. v. Bruggen), Bitium reticulatum (leg. Kuiper), Clathrus clathrus, Chrysallida decussata (leg. v. Zijp), Natica catena, N. poliana alderi, Nassarius reticulatus, Philine aperta quadripartita (leg. Kuiper, in coll. v. Bruggen), Retusa alba (leg. v. Hooven), Mytilus edulis, Chlamys opercularis (leg. v. Hooven), Mysella bidentata, Montacuta

feruginosa, Cardium edule, Venus striatula, Paphia pullastra, Petricola pholadiformis, Spisula solida, S. subtruncata, Mactra corallina cinerea, Donax vittatus, Abra alba, Macoma balthica, Angulus fabula, A. tenuis, Ensis ensis, E. siliqua (leg. v. Zijp), Mya arenarea, Zirphaea crispata (leg. v. Bruggen: 1 doublet in stuk veen; leg. v. Hooven), Barnea candida (leg. v. Bruggen: 1 exemplaar in stuk veen bij IJmuiden), Buccinum undatum.

Met dit fraaie resultaat is wel voldoende bewezen dat de leden die zich door het slechte weer van deelneming hadden laten weerhouden, ongelijk hadden.

Na in de luwte van een duin bij de pier de meegebrachte boterhammen genuttigd te hebben en een uurtje later, onder het genot van warme koffie, op een terras van een restaurant te Wijk aan Zee, nagepraat te hebben over de gedane vondsten, werd de terugtocht aanvaard.

Aan deze excursie hebben deelgenomen de leden: Arends, Aten, v. Bruggen, v. Hooven, Mevr. ten Houten - Pannekoek (met 2 jeugdige secondantjes), Kuiper, Lacourt, Neuteboom, Nieuwenhuis, Pouderoyen, v. Regteren Altena en v. Zijp.