

Overvloedig aanspoelen van boormossels bij Zoutelande

Door het uitzonderlijke weer dat we deze Octobermaand mochten beleven, is het strandbeeld heel anders dan ik het tot nu toe kende. De wind komt dagelijks uit Z. of Z.O. richting, dus is onmerkbaar; daardoor ontstond een strand glad als een parketvloer en de zee als een spiegel. Daardoor is er tevens slechts weinig te bespeuren van een vloedlijn. De gewone mollusken, de wieren en de varia die steeds die lijn aangeven, zijn teruggebracht tot een ijle, smalle strook van jeugdige schelpen hoofdzakelijk van Cardium, Mytilus, Paphia (ook jeugdvormen), enkele Spisula's en nu komt het doel van dit berichtje, een zeer groot getal boormossels. Zij vormen de vloedlijn. Het viel mij op dat Barnea candida overheerste. En, omdat het eigenlijk Petricola had moeten zijn, heb ik van paal 51 - 52 (Zoutelande), dat is 200 meter vloedlijn, alles verzameld wat daar lag aan boormossels. Het resultaat is het volgende:

1. Zirfaea crispata L., 86 exemplaren
2. Barnea candida L., 242 exemplaren.
3. Petricola pholadiformis Lam., 184 exemplaren.

Vooraf bij 1. en 3. zeer vele jeugdvormen, bij 3 ongeveer 20% doosjes.

Ik

Ik acht de aanwezigheid van dit grote aantal witte boormossels verklaarbaar, doordat het transport van deze soort langs het vlakke strand en de rustige vloed, zoo eenvoudig is, dat deze teare schelpen als het ware langs de vloedlijn werden neergelegd. De veel sterkere Petricola kan tegen een stootje, vandaar dat deze steeds bij alle weersgesteldheden te vinden is; maar nu vooral de talrijkste in doosjes; waarbij zelfs zeer jonge vormen als doosje heel bleven.

Ik heb het getelde materiaal nog niet weg gedaan. Het zou kunnen zijn dat het voor leden, die zich voor de boormossels interesseren, nog van belang is, vooral met het oog op de zeer kleine jonge exemplaren (ook bij Zirfaea).

L.de Priester, Zoutelande.