

VONDSTEN OP HET OPGESPOTEN STRAND TE SCHEVENINGEN.

Tijdens de storm van 1 Februari 1953 werd het strand vlak ten noorden van de buitenhaven te Scheveningen zo afgeslagen, dat men, om verzakking van de strandmuur en het havenhoofd te voorkomen, het strand heeft opgehoogd met zand uit de oude binnenhaven. Dit zand, dat natuurlijk met een behoorlijk hoog percentage slik vermengd was, werd met een ingenieus baggerapparaat opgezogen en door een enorme buis naar het strand geleid.

Nu komen er bij het dekwassen op de vissersschepen talrijke mollusken in de haven terecht, die tussen de planken van het dek of in de netten zijn blijven hangen en daarbij zijn heel wat soorten, die niet iedere dag op het strand te vinden zijn, zoals: Cardium echinatum, Neptunea an-

tiqua, Chlamys spp., Aloides gibba, Astarte montagui, Dentalium entalis, etc. De verwachtingen ten aanzien van het opgespoten strand waren dan ook hoog gespannen, maar het resultaat van de diverse speurtochten stelde bepaald teleur. Eénmaal werd een fragment van Solen marginatus gevonden en eenmaal een in verregaande staat van ontbinding verkerende Sepia officinalis, waaraan de armen ontbraken en waarvan het rugschild zwaar beschadigd was; dat was alles wat er aan grotere soorten door mij gevonden werd. Misschien zijn anderen fortuinlijker geweest?

Anders was het echter met het gruis. In het Correspondentieblad no. 51 vertelde de heer Paardekooper daar al wat over en ik kan nog het een en ander aan zijn verslag toevoegen. Ik nam een hoeveelheid gruis van ongeveer een liter mee en trof daarin de volgende soorten aan: Macoma balthica, Spisula subtruncata, Abra alba, Hydrobia ulvae, Mysella bidentata (alle in zeer groot aantal); verder enige tientallen exx. van Cardium edule, Donax vittatus, Angulus fabulus, Tellina tenuis, weinig Natica spp., 11/2 Montacuta ferruginosa, 6 Clathrus clathrus, een kleine 40 fragmenten van Cultellus pellucidus (waarbij enkele bijna gave exx.), 1 Retusa alba, 3/2 Chlamys opercularis, 3/2 Barnea candida, 1/2 Zirfaea crispata en 1 fragment Phytia myosotis. Voorts nog enkele zoetwatervormen: 4 Theodoxus fluviatilis, 4 Pisidium spp. en 7 Valvata piscinalis.

Alleen enkele Cultellus-fragmenten waren groter dan 1 cm. De overige schelpjes varieerden in grootte van plm. 1 tot 7 à 8 mm.

Het door de heer Paardekooper geuite vermoeden omtrent de herkomst van deze schelpjes geloof ik wel te kunnen onderschrijven, maar dan blijven in ieder geval toch nog de vragen: zijn deze mollusken door vissersboten aangevoerd, hebben zij in de haven geleefd, zijn zij uit de ondergrond afkomstig en in zekere zin dus als subfossielen te beschouwen of zijn zij op de normale wijze door de zee op het strand gebracht?

Misschien kunnen eventueel door andere "strandjutters" verrichte waarnemingen een ander licht op deze vragen werpen; de redacteur van het Correspondentieblad zal hun bevindingen ongetwijfeld graag opnemen.

D. J. Boerman.