

VALLEN LIMAX SPEC. LEVENDE DIEREN AAN?

In het tijdschrift "Wild und Hund" (Verlag Parey-Berlin) XLI. Jrg., Nr. 40, 4 Oct. 1935 lazen wij op p. 899 van een waarneming dat drie dagen oude waterspreeuwen in het nest door Limax cinereoniger werden opgegeten; hierbij blijft de vraag open of de slak deze vogels gedood heeft. Als reactie op dit bericht staat in hetzelfde blad (Nr. 43, 25 Oct. 1935) op p. 959, dat een andere waarnemer eens jonge hazen vond, waarvan de buikhuid geheel af- en doorgevreten was door "zwarte slakken" en dat deze diertjes nog niet dood waren. Zijn dergelijke waarnemingen ook al eens in ons land gedaan?

G.M. Roding
Natuurhistorisch Museum, Enschede.

Bij mijn weten werd in Nederland zoiets nog niet geconstateerd. Ik wil echter wel uit Aquila, het Hongaarse ornithologische tijdschrift, Vol. 55-58, 1948-1951, de volgende notitie van István Konok op p. 310 aanhalen. Deze korte mededeling luidt uit het Engels vertaald als volgt:

"Vogels vernietigd door naaktslakken. In de morgen van de 21ste Mei van het jaar 1945 vond ik in Freundorf (Z.-Beieren) een nest met twee dagen oude jongen van de geelgors (*Emberiza citrinella citrinella* L.), die opgevreten waren door grote naaktslakken. Vijf van deze slijmerige zwarte monsters waren nog in het nest, terwijl van het broedsel van vier nog één jong in leven was; zelfs dit was al bijna voor de helft gevild. De rest was zonder meer verzwolgen door de naaktslakken."

v.B.