

ONGEBANDEERDE CEPAEA HORTENSIS

De afgelopen zomer maakte ik verschéidene tochten in de omgeving van Vijlen in Zuid-Limburg. Door het prachtige droge weer werd het, van malacologisch standpunt bezien, geen groot succes.

Reeds tijdens de eerste tochten viel het ons op, dat zich langs een landweg, die in Vijlen begint en vlak bij Lemiers op de grote weg naar Vaals uitkomt, een populatie van Cepaea hortensis bevond, die voornamelijk uit ongebandeerde exemplaren bestond. Tijdens enkele volgende tochten werd speciaal gelet op het voorkomen van gebāndeerde vormen. Helaas heb ik het percentage ongebandeerde vormen niet bepaald. Ruw geschat leek het mij ca. 80 %. Dit komt vrij goed uit bij het veertigtal exemplaren, dat door mij en mijn gezin willekeurig is verzameld. 29 exemplaren vertonen geen banden. Ongeveer $\frac{3}{4}$ is dus ongebandeerd. Bij de gebāndeerde exemplaren trof ik de volgende vormen aan: 12345, 10345 en 10305. Een exemplaar, dat zeer doorschijnend is vertoont lichte doorschijnende banden. Mevrouw van der Feen deelde mij schriftelijk mede, dat dit de forma arenicola is.

Ik vestig de aandacht op deze populatie, omdat in de Fauna van Nederland op pagina 343 vermeld staat, dat het wegvallen van pigmentbanden bij C. hortensis niet zo vaak voorkomt als bij C. nemoralis.

B. Hubert.