

TIJDSCHRIFTEN-NIEUWS

Cheesman, D.F.: "The Snail's Foot as a Langmuir Trough". Vele kleine dieren in het zoete water leven in belangrijke mate van de monomoleculaire laag proteïnen die zich op rivieren, meren enz. bevindt. (Goldacre, 7 Anim. Ecol. 18, (1949), p.36.)

Pomacea canaliculata, een Zuid-Amerikaanse soort blijkt een techniek te bezitten om de oppervlaktefilm samen te persen, waarna de verkregen massa wordt opgegeten. Nature, Vol. 178 (1956), p. 987.

Azevedo, J.F. de & Medeiros, L. de : "Contribution à l'étude comparative de Biomphalaria adowensis Bourg. (Bailundo, Angola) et de B. pfeifferi (Krauss) (Sud do Save, Moçambique), par l'anatomie des organes génitaux, considérant les deux espèces du point de vue des caractères conchyliologiques."

De auteurs komen op anatomische gronden tot de conclusie, dat het hier gaat om twee duidelijk te onderscheiden soorten. Bull. de la Soc. de Pathologie Exotique, Vol.49 no.5, pp 815-823, Paris 1956, 9 fig. 5 ref.

(Ontvangen van de heren W.J.v.d.Burg resp. A.B. Stam).