

UIT DE LITERATUUR.

Bruggen, A.C. van, 1957. Notes on some land and freshwater Mollusca from Auvergne, France. Zool. Mededel. Dl. XXXV, No. 2, pp. 9-20, figs. 1-2.

Tijdens een excursie naar het département Puy de Dôme, Auvergne, Midden-Frankrijk (1955) werd materiaal verzameld van 45 soorten land- en zoetwatermollusken. Hiervan waren 14 (31%) nieuw voor Auvergne. Van Pisidium hibernicum en P. lilljeborgii kon het voorkomen in recente staat in Frankrijk vastgesteld worden. Het interessantst is ongetwijfeld het ontdekken van een nieuwe vindplaats van Arion lusitanicus. Deze grote naaktslak, door Van Regteren Altena, Aten & Schouten van de Pyreneeën vermeld, werd op de bodem van een beukenbos ZZO van het dorpje Besse-en-Chandesse verzameld. Deze vindplaats ligt ongeveer 300 km. meer naar het Noorden dan de noordelijkste localiteit in de Pyreneeën.

A.C. v. B.

Geijskes, D.C. & T. Pain, 1957. Suriname freshwater snails of the genus Pomacea. Studies on the fauna of Suriname and other Guyanas Vol. I, No. 3, pp. 41-48, plates IX-X.

Van het geslacht Pomacea zijn blijkens deze recente publicatie 10 soorten en ondersoorten in Suriname aangetroffen; van twee soorten en één ondersoort konden de auteurs geen bevestiging van het voorkomen krijgen. Deze vormen zijn wel van de aangrenzende gebieden bekend; in de determineertabel zijn echter slechts de zeven andere vormen opgenomen.

Volume I (Uitgave Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen, verkrijgbaar bij of via Martinus Nijhoff, Den Haag, à fl. 6,-) bevat verder artikelen over "The zoological exploration of Suriname" (Geijskes) en "Notes on the Primates of Suriname" (Husson); deze verzorgde uitgave omvat 48 pagina's en tien platen. Het is alleen te betreuren dat er nu weer een nieuw zoölogisch tijdschrift aan de schier eindeloze reeks is toegevoegd.

A.C. v. B.

Orr, Virginia, 1956. The South African Gastropod genus Burnupena (Buccinidae). Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia Vol. CVIII, pp. 249-263, figs. 1-2, plates 19-20.

De revisie van Virginia Orr is voornamelijk gebaseerd op materiaal dat zij gedurende een drie maanden lange tocht van 26 verschillende plaatsen langs de kust van Zuid-Afrika verkreeg. Het blijkt dat het genus Burnupena, een geslacht dat van de kusten van Frans Aequatoriaal Afrika tot aan die van Natal bekend is, slechts twee soorten bevat, t.w. B. papyracea (Brug.) en B. delalandi (Kien.). Eerstgenoemde soort is onder te verdelen in de volgende subspecies: papyracea s.s. (Westkust), cincta (Röd.) (Zuidkust), tigrina (Kien.) (Zuid- en Zuidoostkust) en lagenaria (Lam.) (Zuid-oost- en Oostkust). Voortreffelijke afbeeldingen van schelpen en radula's illustreren deze belangrijke publicatie.

A.C. v. B.