

RECHTERSCHELPEN VAN CHLAMYS OPERCULARIS.

In augustus 1957 bracht ik een bezoek aan de afgraving in het Poederlien te Nieuw-Namen in Zeeuws Vlaanderen op de grens van België. Deze lagen werden vroeger tot het Plioceen gerekend. Er bleken twee ontsluitingen te zijn. De nieuwste groeve, die zich naast de oude bevindt, leverde een groot aantal gave exemplaren op van Chlamys opercularis, een aantal onherkenbare steenkernen van bivalven en een juveniel exemplaar van Neptunea contraria.

Bij nadere bestudering van het materiaal viel het mij op dat ik voornamelijk rechterschelpen van Chlamys opercularis had gevonden.

Bestudering van de afbeelding die Heimans geeft in zijn publicatie over deze groeve (Levende Natuur 1911, jaarg. 15) geeft mij de indruk dat ook deze onderzoeker overwegend rechterschelpen heeft gevonden.

Een soortgelijk verschijnsel wordt door van Regteren Altena vermeld over Pecten maximus complanatus op de Kaloot (zie Dissertatie).

Ik kan mij slechts voorstellen dat de linkerkleppen zwakker zijn en minder goed geconserveerd blijven.

Ik ben benieuwd of dergelijke verschijnselen meer zijn waargenomen en welke verklaring men daarvoor heeft gevonden.

B. Hubert.