

KORTE MEDEDELINGENKoninklijke/Shell Prijs

Zojuist bereikt ons het bericht, dat de in 1959 ingestelde Koninklijke/Shell Prijs voor de eerste maal is toegekend aan prof. dr. J. Lever.

De prijs groot f. 10.000.-- is 29 januari 1960 aan prof. Lever uitgereikt in Den Haag door ir. L. Schepers, directeur van de N.V. Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij.

Het is de bedoeling dat prof. Lever het toegekende bedrag zal besteden ter voortzetting van zijn onderzoek van het aanspoelingsmechanisme van schelpen en dat biologische studenten van de Vrije Universiteit te Amsterdam aan dit onderzoek zullen blijven deelnemen. Van meet af aan heeft dit onderzoek vele onze leden geboeid, die er van kennis hebben kunnen nemen door prof. Lever's voordracht in de vergadering van 1 maart 1958 te Amsterdam en door zijn artikel in Basteria vol. 22 (1958), p. 21-68. Het lijkt daarom niet misplaatst prof. Lever hier namens onze vereniging geluk te wensen met deze waardering voor zijn initiatief en succes te wensen met de voortzetting van zijn onderzoek.

C.O. v. R.A.

Schelpen van Zuidwest-Afrika

Onlangs ontving ik een kleine bezending mariene mollusken verzameld in 1959 door de heer Mandersloot bij Lüderitz, Zuidwest-Afrika. Lüderitz ligt op ongeveer 27° ZB aan de Atlantische Oceaan; langs de kust stroomt hier noordwaarts de koude Benguella Current, zodat de samenstelling van de molluskenfauna hier geheel anders is dan aan de oostkust van Zuid-Afrika. Toch blijkt dat een aantal geslachten, die oorspronkelijk aan tropische en subtropische kusten thuishoren, hier nog voorkomen. Het materiaal was als volgt samengesteld:

-Patella-

Patella compressa, 4 ex., waarvan de twee grootste respectievelijk 85 x 33 mm (40 mm hoog) en 73 x 36 mm (38 mm hoog) meten;

Patella granularis, 3 ex.;

Patella miniata, 1 ex.;

Oxysteles cf. tigrina, 1 ex.;

Ancilla cf. bulloides, 2 ex., sterk afgesleten;

Burnupena papyracea, 2 ex.;

Argobuccinum argus, 12 ex.,

Purpura cingulata, 1 ex.;

Conus elongatus, 1 ex., 60 mm lang;

Mytilus crenatus, 9/2 ex.

Zoals gezegd, is het interessant om hier nog een Conussoort en Argobuccinum te vinden. Argobuccinum argus was ter plaatse zeer algemeen. Het grootste deel van het materiaal is min of meer afgesleten; de kust bij Lüderitz is namelijk zeer hard en rotsig.

A.C. van Bruggen.

Een nieuwe vindplaats van Lithoglyphus naticoides (Férussac)

Bij het doorzoeken van een op 4 - X - 1959 op het Leekstermeer verzameld monster mollusken werden meerdere exemplaren aangetroffen - van groot tot klein met dier - van Lithoglyphus naticoides (Férussac).

Dit is thans - voorzover mij bekend - naast Haren de tweede vindplaats van deze soort in de provincie Groningen.

Delfzijl, 25-1-1960

A.K. Schuitema.