

KORTE MEDEDELINGEN.

Venus gallina striatula da C. en Venus gallina gallina Linné.

Wanneer in een monster venusschelpen exemplaren van beide soorten (of ondersoorten) voorkomen, zal het meestal heel moeilijk zijn om weer tot een bevredigende scheiding te komen: in het beste geval komen we hierbij misschien tot nogal vage resultaten. Toch is er in ieder geval één kenmerk, dat geheel opgaat en daarbij gemakkelijk is te hanteren: de lengte van de mantelbocht. Bij de Atlantische vorm is deze 2 maal zo lang als het achterste spierindruxsel; bij vorm uit de Middellandse Zee steekt de mantelbocht nauwelijks of helemaal niet uit. Een aantal steekproeven in de collectie van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden bevestigde dit verschil geheel.

Er zijn nog diverse andere verschillen (maximale grootte, sculptuur, paarse vlek aan de binnenzijde) maar het slot van beide vormen lijkt geheel identiek te zijn.

Het is niet mijn bedoeling anderen aan het werk te zetten, maar als ons medelid de heer H. van Haren zou kunnen vertellen hoe hij de 2 vormen weet te scheiden, als wij ze door elkaar gegooid hebben, dan late hij zich niet weerhouden door het veronderstelde "onbelang" van zijn kennis in deze.

R.M. van Urk.