

UIT DE LITERATUUR.

Barnard, K.H., 1959. Contributions to the knowledge of South African marine Mollusca. Part II. Gastropoda: Prosobranchiata: Rhachiglossa. Ann. S. Afr. Mus. Vol. XLV, Pt. I, pp. 1-237.

Het tweede deel van Barnard's Contributions to the knowledge of South African marine Mollusca verscheen in 1959 en behandelt ditmaal de Rhachiglossa (Gastropoda)

-in-

in 237 bladzijden. Het eerste deel (aanwezig in de bibliotheek van de Vereniging) is besproken in CB no. 82, p. 820. De opzet van het tweede deel is geheel gelijk aan die van het eerste. Ook dit deel bevat een aantal geslachten die als moeilijk in Zuid-Afrika te boek staan, zoals Marginella, Nassa en Columbella. Barnard schat bijv. dat er een zestigtal soorten van het genus Marginella aan de Zuidafrikaanse kust voor moeten komen; hij behandelt 24 soorten waarbij hij veel aandacht besteedt aan de synoniemie. Zoals reeds eerder gezegd, het kritische werk van Barnard heeft heel wat moeilijkheden uit de weg geruimd, vooral in geslachten waar een onontwarbare hoeveelheid synoniemen beginnening en vakman het leven zuur maken (Nassa!). De waarde van deze publicatie wordt nog verhoogd door 52 uitstekende tekeningen van schelpen (met details van de structuur) en radula's. Behalve enkele lagere categorieën beschreef Barnard de volgende 28 nieuwe soorten:

Cancellaria (1), Fulgoraria (1), Fusivoluta (2), Mitra (1), Fusus (3), Fasciolaria (1), Nassa (3), Pyrene (1), Columbella (4), Latiaxis (1), Coralliophila (2), Trophon (5), Typhis (1) en Columbarium (2).

Een groot deel van de nieuw beschreven soorten zijn Gastropoden afkomstig uit dieper water van de vangsten van onderzoekingsvaartuigen.

Voor twee interessante punten wil ik nog Uw speciale aandacht vragen. Twee exemplaren behorend tot het geslacht Cancellaria worden onder voorbehoud geïdentificeerd als lyrata Brocchi, een soort die oorspronkelijk van fossiele exemplaren (Zuid-Europa) is beschreven en later recent in de Atlantische Oceaan werd aangetroffen. Verder verschijnt op pp. 123-124 een interessante noviteit, n.l. een tabel voor de Zuidafrikaanse Bulliasoorten, uitsluitend gebaseerd op kenmerken van het operculum.

Men dient Barnard geluk te wensen met deze voortreffelijke publicatie, waarvan vooral de kritische instelling hoogst belangrijk is. Het is te wensen dat deze actieve (reeds niet meer jeugdige) malacoloog nog de gelegenheid zal krijgen deze serie, die een basis voor een toekomstige monografie van de Zuidafrikaanse mariene mollusken vormt, te voltooien.

A.C. van Bruggen.

Ockelmann, W.K., The Zoology of East Greenland. Marine Lamellibrachiata. (Reprinted from Meddelelser om Grønland, Bd. 122, Nr. 4. Copenhagen, Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, 1958. 256 pp., Pl. 1-3, fig. 1-28.

Groenland is een gebied, waar de gemiddelde schelpenliefhebber vermoedelijk maar weinig contact mee zal hebben. Er is voor ons echter reden om deze (overigens ook zeer interessante) publicatie met meer dan gewone aandacht te bekijken. Op p. 194-201 vinden we n.l. een tabel, die de verspreiding van de Lamellibrachiaten in het hoge Noorden aangeeft. In het Engels: Synopsis of the marine Lamellibranchs of N.E. America, Greenland, Jan Mayen, Spitzbergen, Iceland, Norway and the Faroes (including the deep-water species occurring near Greenland, Jan Mayen, Spitzbergen and Iceland).

Voor hen, die in de schelpenfauna van Europa zijn geïnteresseerd, is hier in ieder geval wat betreft de tweekleppigen een geheel bijgewerkt overzicht van de soorten in deze (ons over het algemeen zo weinig bekende) Noordelijke gebieden. Het zal mij hopenlijk niet kwalijk worden genomen, als ik zeg, het boek liever niet uit te lenen. Belangstellenden zijn echter ten allen tijde mondeling of schriftelijk welkom aan onderstaand adres.

Ant. Heinsiusstraat 46
Den Haag.

R.M. van Urk.