

HET KUNSTDUIN TE BRESKENS

Het heeft lang geduurd, maar het is er tenslotte toch van gekomen. De schamele duintjes, die vroeger Breskens tegen het water moesten beschermen hebben plaats gemaakt voor een fors kunstduin. Een verbetering ! Niet alleen wat de veiligheid betreft, maar ook malacologisch gezien is mijn woonplaats er beslist interessanter door geworden. De enorme hoeveelheid zand, die voor het kunstduin nodig was, is namelijk uit de Wester-Schelde, vlak voor het zogenaamde 1e Strand van Breskens, opgezogen. Het duin is hierdoor bijzonder schelprijk geworden. Weliswaar zijn de meeste grote soorten beschadigd, maar van de kleinere werden (en worden) vele gave exemplaren verzameld.

Behalve in het kunstduin, kan men ook op het strand zoeken. Dit vooral na storm of springvloed. Het duin loopt namelijk met een glooiing in het strand over, zodat het water hieruit bij hoge standen de schelpen kan loswoelen, die dan verderop in het aanspoelsel terechtkomen.

Hieronder een aantal vondsten. Alle vermeldingen hebben betrekking op gave, of zo goed als gave exemplaren. Van Scaphella lamberti werden b.v. zeer vele fragmenten gevonden.

Het feit, dat bijna enkel horens vermeld zijn moet met de fossielenatlas in Basteria in verband gebracht worden.

<u>Emarginula reticulata</u>	3 ex.	<u>Liomesus dalci</u>	1 ex.
<u>Gibbula magus</u>	1 ex.	<u>Nassarius lamellilabrus</u>	7 ex.
<u>Epitonium frondiculum</u>	1 ex.	<u>Nassarius dollfusi</u>	3 ex.
<u>Capulus unguis</u>	2 ex.	<u>Scaphella lamberti</u>	3 ex.
<u>Capulus ungaricus</u>	1 ex.	<u>Brocchinia mitraeformis</u>	1 ex.
<u>Aporrhais scaldensis</u>	12 ex.	<u>Clavus modiola</u>	1 ex.
<u>Velutina velutina</u>	1 ex.	<u>Terebra inversa</u>	7 ex.
<u>Erato pernana</u>	1 ex.	<u>Bittium reticulatum</u>	alg.
<u>Simnia leathesi</u>	1 ex.	<u>Paphia senescens</u>	alg.
<u>Trophon muricatus</u>	7 ex.	<u>Pycnodonta spec.</u>	alg.
<u>Thais lapillus incrassata</u>	1 ex.	<u>Astarte omalii</u>	alg.
<u>Ocenebra erinaceus</u>	42 ex.		

Voor al de Eemfossielen waren dus algemeen, hetgeen ook uit nog andere vondsten bleek. Van de Eocene Turritella solanderi werden enkele fragmenten gevonden.

Aangezien er onder de malacologen ook vele haaietand-liefhebbers blijken te zijn, kan hier tenslotte de vondst van een exemplaar van de zeldzame Notidamus gigas vermeld worden.

E. Gittenberger jr. Spuiplein 37
BRESKENS.