

EUROPESE LAND- EN ZOETWATERMOLLUSKEN IN AUSTRALIE.

Naar aanleiding van het artikel van A.C. van Bruggen "Malacologiseren in en rond Port Elisabeth" in Correspondentieblad No. 93 p. 950 (maart 1961) kan het van belang zijn twee artikelen in herinnering te brengen, die betrekking hebben op Europese mollusken als emigranten. Enige zeer interessante punten zullen na bestudering duidelijk worden. De artikelen zijn respectievelijk: B.C. Cotton, 1954, Catalogue of introduced snails and slugs in Australia, Records of the South Australian Museum, 6 may 1954 en H.E. Quick 1952, Emigrant British snails, Proc. of the Malacological Society of London, 1952. Mr. Quick is een welbekend specialist voor land- en zoetwatermollusken. Mr. Cotton is meer gespecialiseerd in zeeschelpen. Mr. Cotton's lijst is de volgende en bevat een aantal soorten welke niet door Mr. Quick genoemd worden, welke laatste inplaats daarvan een aantal soorten noemt welke niet door Cotton zijn opgenomen.

Milax gagates Drap.	Z.W. Europa	H. (Microxeromagna)	
Limax maximus L.	Europa	stolismena Bourg.	Z. Europa
Limax flavus L.	Europa	Helicella heripensis Mabille	C. Europa
Limax marginatus Müller	Europa	Cochlicella acuta Müller	Z.W. Europa
Agriolimax laevis Müller	Europa	Cochlicella ventrosa Fer.	Z. Europa
Agriolimax reticulatus Müll.	Z. Europa	Helix aspersa Müller	Europa
Arion hortensis Fer.	Europa	Oxychilus cellarius Müller	Europa
Arion ater L.	Europa	Oxychilus alliarius Müller	Europa
Testacella haliotidea Drap.	W. Europa	Geostilbia aperta Swainson	Z. Europa
Euparypha pisana Müller	Europa	Vitrea crystallina Müller	Europa
Helicella itala L.	Europa	Zonitoides nitidus Müller	Europa
H. (Xerocincta) neglecta Drap.	Z. Europa	Lymnaea pereger Müller	Europa
H. (Cernuella) virgata Da C.	W. Europa	Lymnaea stagnalis L.	Europa
H. (Candidula) caperata Mont.	Europa	Planorbis spirorbis L.	Europa

Mr. Quick's lijst bevat verder:

Arion subfuscus Drap.
Arion hortensis Fer.
Testacella maugii Fer.

Helicella caperata Mont.
Oxychilus cellarius Müller
Vallonia costata Müller
Vallonia pulchella Müller

Hij noemt als zeer twijfelachtig 1 exemplaar Cepaea nemoralis gevonden in het National Park in South Australia.

Het eigenaardige van beide lijsten is dat de meest gewone soorten als Cepaea nemoralis en de gewone Planorbidae volkomen ontbreken terwijl andere minder algemene soorten wel gevoelig blijken te zijn voor de propaganda van het Australische Imigratiebureau. Intussen geldt hetzelfde voor Zuid-Afrika. Kan iemand daarvoor een verklaring geven ?

Sydney, 17 mei 1961
Jacques Voorwinde.