

NAAMLIJST VAN DE NEDERLANDSE LAND- EN ZOETWATERMOLLUSKEN

door

W.S.S. van Benthem Jutting en C.O. van Regteren Altena

Inleiding.

Sedert in het Correspondentieblad no. 9-10 (1937) een naamlijst van de Nederlandse mollusken verscheen, en later, in deel 11 van Basteria, blz. 54-86 (1947), een Lijst van Gemeenten als Vindplaatsen van Nederlandse Mollusken werd gepubliceerd, is de behoefte ontstaan om andermaal een naamlijst samen te stellen, rekening houdende met de nieuwste opvattingen van de zoölogische nomenclatuur, en met de aanwinst van enige soorten, nieuw voor de Nederlandse fauna.

In de onderstaande naamlijst beperken wij ons tot de land- en zoetwatermollusken. Doordat in deze rubriek vele namen als "nomina conservanda" zijn vastgelegd, en dus onveranderd zullen blijven, vereiste de samenstelling slechts weinig moeite. Voor de mariene fauna is het echter momenteel nog niet mogelijk een zodanige lijst op te stellen wegens de vele onzekerheden en tegenstrijdige meningen betreffende een groot aantal namen.

De naamlijst is gesplitst in twee gedeelten: A. de thans nog levende soorten, en B. de uitgestorven kwartaire soorten. In deze laatste rubriek zijn de niet-mariene mollusken uit het Nederlandse Kwartair opgenomen, welke in ons land niet meer recent voorkomen. Deze afdeling B. is voornamelijk gebaseerd op de Nieuwe Lijst der kwartaire Land- en Zoetwatermollusken in Nederland door P. Tesch (1944, Meded. Rijks Geol. Dienst (A) no. 10), aangevuld met enige gegevens van latere datum.

De soorten zijn in systematische volgorde gerangschikt, met inachtneming van de classificatie van Thiele (Handbuch der systematischen Weichtierkunde, 1929-1935), en Wens en Zilch (Handbuch der Paläozoologie, 1938-1944 en 1959-1960). Indien de thans gebruikte naam afwijkt van die, welke in 1947 in de Lijst van Gemeenten enz., resp. de lijst van Tesch van 1944, voorkomt, werd de laatste tussen haakjes toegevoegd.

Enkele soorten, welke in de twee voorgaande lijsten waren opgenomen, zijn ditmaal weggelaten, omdat hun voorkomen in Nederland, na een of twee oude vermeldingen, in latere jaren niet is bevestigd. Het zijn: Abida secale (Draparnaud), Chondrina avenacea (Bruguière) en Ena montana (Draparnaud). Zolang van Chondrula tridens (Müller) geen levende exemplaren in ons land zijn aangetroffen, beschouwen wij haar liever als een in het Kwartair hier uitgestorven soort. Cochlicella acuta (Müller, 1774) is niet opgenomen, omdat tot dusver alleen aangespoelde lege huisjes werden gevonden.

Voor enkele families ontvingen wij de zeer gewaardeerde medewerking en adviezen van specialisten in de betreffende groepen.

A. Naamlijst der thans nog levende soorten.

Classis GASTROPODA
Subclassis Prosobranchia
Ordo Archaeogastropoda
Familia Neritidae

- Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)
 - Ordo Mesogastropoda
 - Familia Viviparidae
- Viviparus contectus (Millet, 1813) (V. lacustris Beck)
- " viviparus (Linnaeus, 1758)
 - Familia Valvatidae
- Valvata cristata Müller, 1774
- " macrostoma Mörch, 1864
- piscinalis (Müller, 1774)
 - Familia Pomatiidae
- Pomatias elegans (Müller, 1774)

Familia Hydrobiidae

Hydrobia stagnorum (Gmelin, 1790) (H. stagnalis Baster)" ulvae (Pennant, 1777)Paladilhia bourguignati (Locard, 1883) (Avenionia bourguignati Locard)Bythinella dunkeri (Frauenfeld, 1856)Pseudamnicola confusa (Frauenfeld, 1863)Potamopyrgus jenkinsi (Smith, 1889)Marstoniopsis scholtzi (Schmidt, 1856) (M. steini Martens)Lithoglyphus naticoides (Pfeiffer, 1828)Bithynia leachii (Sheppard, 1823)" tentaculata (Linnaeus, 1758)

Familia Assimineidae

Assiminea grayana Fleming, 1828

Subclassis Opisthobranchia

Ordo Acoela

Familia Tergipedidae

Embletonia pallida Alder & Hancock, 1854Tergipes despectus (Johnston, 1835)

Subclassis Pulmonata

Ordo Basommatophora

Familia Ellobiidae

Carychium minimum Müller, 1774" tridentatum (Risso, 1826)Ovatella myosotis (Draparnaud, 1801) (Phytia myosotis Draparnaud)Leucophytia bidentata (Montagu, 1808) (Ovatella bidentata Montagu)

Familia Physidae

Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758)Physa acuta Draparnaud, 1805" fontinalis (Linnaeus, 1758)

Familia Lymnaeidae

Lymnaea (Galba) truncatula (Müller, 1774)" (Stagnicola) glabra (Müller, 1774)" " palustris (Müller, 1774)" (Radix) auricularia (Linnaeus, 1758)" " peregra (Müller, 1774) (L. ovata Draparnaud)" (Lymnaea) stagnalis (Linnaeus, 1758)Myxas glutinosa (Müller, 1774)

Familia Planorbidae

Planorbis (Planorbis) carinatus Müller, 1774" " planorbis (Linnaeus, 1758)" (Anisus) leucostoma Millet, 1813" " spirorbis (Linnaeus, 1758)" " vortex (Linnaeus, 1758)" " vorticulus Troschel, 1834" (Bathyomphalus) contortus (Linnaeus, 1758)" (Gyraulus) albus Müller, 1774" " laevis Alder, 1838" " riparius Westerlund, 1865" (Armiger) crista (Linnaeus, 1758)Segmentina (Hippeutis) complanatus (Linnaeus, 1758) (Planorbiscomplanatus Linnaeus)" (Segmentina) nitida (Müller, 1774)Planorbis corneus (Linnaeus, 1758) (Planorbis corneus Linnaeus)

Familia Aculyliidae

Ancylus fluviatilis Müller, 1774Acrolopus lacustris (Linnaeus, 1758)

Ordo Stylommatophora

Familia Cochlicopidae

Cochlicopa lubrica (Müller, 1774)" lubricella (Porro, 1838) (C. minima Siemaschko)

Familia Vertiginidae

Columella edentula (Draparnaud, 1805)Truncatellina cylindrica (Férussac, 1807)" strobeli hooveni Bayer, 1938

- Vertigo angustior Jeffreys, 1830
 " antivertigo (Draparnaud, 1801)
 " moulinsiana (Dupuy, 1849)
 " pusilla Müller, 1774
 " pygmaea (Draparnaud, 1801)
 " substriata (Jeffreys, 1833)
 Familia Oculidae
- Orcula dolioleum (Bruguière, 1792)
 Familia Pupillidae
- Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758)
- Lauria cylindracea (Da Costa, 1778)
 Familia Valloniidae
- Vallonia costata (Müller, 1774)
 " excentrica Sterki, 1893
 " pulchella (Müller, 1774)
- Acanthinula aculeata (Müller, 1774)
- Spermoea lamellata (Jeffreys, 1830) (Acanthinula lamellata Jeffreys)
 Familia Enidae
- Ena obscura (Draparnaud, 1801)
 Familia Succineidae
- Catinella arenaria (Bouchard-Chantereaux, 1837) (Succinea arenaria
 Bouchard-Chantereaux)
- Succinea (Succinea) putris (Linnaeus, 1758)
 " (Succinella) oblonga Draparnaud, 1801
 " (Oxyloma) elegans Risso, 1826
 " sarsi Esmark, 1886
 Familia Endodontidae
- Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801)
- Helicodiscus singleyanus inermis H.B. Baker, 1929
- Discus rotundatus (Müller, 1774) (Gonyodiscus rotundatus Müller)
 Familia Arionidae
- Arion circumscriptus Johnston, 1828
 " hortensis Féruccac, 1819
 " intermedius Normand, 1852
 " rufus (Linnaeus, 1758) (A. ater Linnaeus)
 " subfuscus Draparnaud, 1805
 Familia Vitrinidae
- Vitrina pellucida (Müller, 1774)
- Phenacolimax major (Féruccac, 1807) (Vitrina major Féruccac)
- Eucobresia diaphana (Draparnaud, 1805) (Vitrina diaphana Draparnaud)
 Familia Zonitidae
- Vitre a contracta Westerlund, 1873
 " crystallina (Müller, 1774)
- Aegopinella nitidula (sensu Rossmaessler, 1835) (Retinella nitidula
 Draparnaud)
 " pura (Alder, 1830) (Retinella pura Alder)
- Nesovitre a petronella (Pfeiffer, 1853) (Retinella hammonis Ström)
- Oxychilus alliarius (Miller, 1822)
 " cellarius (Müller, 1774)
 " draparnaudi (Beck, 1837) (O. draparnaldi Beck)
- Zonitoides excavatus (Alder, 1830)
 " nitidus (Müller, 1774)
 Familia Milacidae
- Milax gagates (Draparnaud, 1801)
 " rusticus (Millet, 1843)
 " sowerbyi (Féruccac, 1823)
 Familia Limacidae
- Limax (Malacolimax) tenellus Müller, 1774
 " (Limax) cinereoniger Wolf, 1803
 " " maximus Linnaeus, 1758
 " (Limacus) flavus Linnaeus, 1758
 " (Lehmannia) marginatus Müller, 1774 (Lehmannia marginata Müller)
- Deroceras laeve (Müller, 1774)
 " reticulatum (Müller, 1774)

Familia Euconulidae

Euconulus fulvus (Müller, 1774) (*E. trechiformis* Montagu)

Familia Ferrussaciidae

Cecilioides acicula (Müller, 1774)

Familia Clausiliidae

Cochlodina laminata (Montagu, 1803) (*Clausilia laminata* Montagu)*Iphigena lineolata* (Held, 1836) (*Clausilia lineolata* Held)" *rolphii* (Turton, 1831) (*Clausilia rophii* Leach)*Laciniaria bisplicata* (Montagu, 1803) (*Clausilia bisplicata* Montagu)*Clausilia bidentata* (Ström, 1765)" *dubia* Draparnaud, 1805" *parvula* Féruccac, 1807*Balea perversa* (Linnaeus, 1758)

Familia Bradybaenidae

Bradybaena fruticum (Müller, 1774) (*Eulota fruticum* Müller)

Familia Helicidae

Candidula gigaxii (Pfeiffer, 1850) (*Helicella heripensis* Mabille)" *intersecta* (Poiret, 1801) (*Helicella caperata* Montagu)" *unifasciata* (Poiret, 1801) (*Helicella unifasciata* Poiret)*Cernuella virgata* (Da Costa, 1778) (*Helicella virgata* Da Costa)*Helicella itala* (Linnaeus, 1758) (*Helicella ericetorum* Müller)*Monacha cantiana* (Montagu, 1803) (*Theba cantiana* Montagu)" *cartusiana* (Müller, 1774) (*Theba cartusiana* Müller)*Monachoides incarnata* (Müller, 1774) (*Monacha incarnata* Müller)" *rubiginosa* (Schmidt, 1853) (*Monacha rubiginosa* Schmidt)*Trichia hispida* (Linnaeus, 1758) (*Fruticicola hispida* Linnaeus)" *striolata* (Pfeiffer, 1828) (*Fruticicola striolata* Pfeiffer)*Helicodonta obvoluta* (Müller, 1774)*Arianta arbustorum* (Linnaeus, 1758)*Helicigona lapicida* (Linnaeus, 1758)*Theba pisana* (Müller, 1774)*Cepaea hortensis* (Müller, 1774)" *nemoralis* (Linnaeus, 1758)*Helix aspersa* Müller, 1774" *pomatia* Linnaeus, 1758

Classis BIVALVIA

Ordo Eulamellibranchia

Familia Unionidae

Unio crassus batavus (Maton & Rackett, 1807)" *pictorum* (Linnaeus, 1758)" *tumidus* Philipson, 1788*Anodonta anatina* (Linnaeus, 1758) (*Anodonta piscinalis* Nilsson)" *cygnea cygnea* (Linnaeus, 1758)" " *zellensis* (Gmelin, 1791)*Pseudanodonta complanata* (Rossmaessler, 1835)

Familia Sphaeriidae

Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758)" *lacustre* (Müller, 1774)" *rivicola* (Lamarck, 1818)" *solidum* (Normand, 1844)*Pisidium amnicum* (Müller, 1774)" *casertanum* (Poli, 1791)" *henslowanum* (Sheppard, 1823)" *hibernicum* Westerlund, 1894" *milium* Held, 1836" *moitessierianum* Paladilhe, 1866" *nitidum* Jenyns, 1832" *obtusale* (Lamarck, 1818)" *personatum* Malm, 1855" *pseudosphaerium* Favre, 1927" *pulchellum* Jenyns, 1832" *subtruncatum* Malm, 1855" *supinum* Schmidt, 1851" *tenuilineatum* Stelfox, 1918

Familia Dreissenidae
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)
Congeria (Mytilopsis) cochleata (Kockx in Nyst, 1835)

B. Naamlijst van de uitgestorven kwartaire soorten.

- Familia Neritidae
- Theodoxus danubialis (Pfeiffer, 1828)
- " serratiliniformis (Geyer, 1914)
- Familia Viviparidae
- Viviparus diluvianus (Kunth, 1865)
- " medius (Woodward, 1833) incl. V. glacialis (Wood, 1874)
- Familia Valvatidae
- Valvata goldfussiana Wüst, 1900
- " naticina Menke, 1845
- Familia Hydrobiidae
- Belgrandia sp.
- Nematurella minima Tesch, 1939
- " runtoniana Sandberger, 1880
- " stenostoma Nordmann, 1901
- Familia Planorbidae
- Planorbis (Gryaulus) acronicus (Férussac, 1807) (P. gredleri Gredler)
- Familia Vertiginidae
- Vertigo parcedentata (Braun, 1843)
- Columella columella (Martens, 1830)
- Familia Orculidae
- ? Orcula dolium (Draparnaud, 1801)
- Familia Valloniidae
- Vallonia tenuilabris (Braun, 1847)
- Familia Enidae
- Chondrula tridens (Müller, 1774)
- Familia Succineidae
- Succinea antiqua Colbeau, 1867
- Familia Endodontidae
- Discus ruderatus (Hartmann, 1821) (Goniodiscus ruderatus Hartmann)
- Familia Vitrinidae
- Semilimax kochi (Andreae, 1884) (Vitrina kochi Andreae)
- Familia Zonitidae
- Retinella hiulca (Albers, 1850)
- Familia Clausiliidae
- Clausilia pumila Pfeiffer, 1828
- Familia Helicidae
- Perforatella bidentata (Gmelin, 1790) (P. bidentata Chemnitz)
- Familia Corbiculidae
- Corbicula fluminalis (Müller, 1774)
- Familia Sphaeriidae
- Pisidium clessini Neumayr, 1875 (P. astartoides Sandberger)
- " lilljeborgi Clessin, 1886
- " vincentianum Woodward, 1913